

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЛЬОНУ НАСІННЯ

(SEMINA LINI)

Склад:

діюча речовина: льону насіння Semina Lini;

1 пачка містить льону насіння (Semina Lini) – 100 г або 200 г.

Лікарська форма. Насіння.

Основні фізико-хімічні властивості: насіння сплюснуте, яйцевидної форми, загострене з одного боку та закруглене з іншого, нерівнобоке, довжиною до 6 мм, товщиною до 3 мм. Поверхня насіння гладка, блискуча, зі світло-жовтим, виразно помітним насінним рубчиком (лупа 10 х). Колір насіння від світло-жовтого до темно-коричневого. Запах відсутній. Смак слизисто-маслянистий.

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування кислотозалежних захворювань.
Код АТХ А02 Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять обволікаючу, протизапальну і легку проносну дію, вкриваючи тонким шаром слизові оболонки травного тракту та запобігаючи їх подразненню.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

У складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного тракту (ентерити, коліти, езофагіти, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки),

запальних процесів шкіри (фурункульоз, абсцеси).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гострий та хронічний холецистит у стадії загострення; непрохідність кишечника.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовувати лише за призначенням лікаря у випадку, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 чайну ложку насіння залити 100 мл окропу і збовтувати протягом 15 хвилин, процідити. Внутрішньо застосовувати тільки свіжоприготований препарат у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ¼ склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки, віком 7-12 років – по 1 столовій ложці, віком 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Зовнішньо застосовувати сухе нагріте насіння у полотняних мішечках або свіжоперемелене, запарене у невеликій кількості окропу у вигляді припарок при фурункулах та абсцесах для прискорення їх дозрівання.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування.

При передозуванні можлива діарея.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції. При тривалому застосуванні – діарея та больовий синдром. При виникненні побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 г або по 200 г у пакети з вкладанням у пачку.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.