

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

сірчана мазь проста

Склад:

діюча речовина: 1 г мазі містить сірки 0,333 г;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т-2.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь жовтого або світло-жовтого кольору, без запаху. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування акне. Препарати, що містять сірку.

Код АТХ D10A B02.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Лікарський засіб чинить протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіді і пентатіонова кислота, що мають антисептичну дію.

Фармакокінетика. При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та вазелін, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

Клінічні характеристики.

Показання.

У складі комбінованої терапії шкірних захворювань – себореї, сикозу, псоріазу, мікозу, корости.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату. Дитячий вік до 3 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія мазі з окиснювачами (водню пероксиду розчин, калію перманганат) може призвести до хімічного опіку. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

Особливості застосування.

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Застосування мазі не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Лікарський засіб застосовувати зовнішньо.

Дорослим та дітям віком від 3 років мазь наносити на уражені ділянки шкіри 2–3 рази на день.

При лікуванні корости схема застосування препарату і вимоги дотримання правил особистої гігієни визначаються індивідуально.

Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Діти.

Препарат протипоказаний дітям віком до 3 років. При лікуванні дітей віком від 3 до 12 років

мазь можна застосовувати за рекомендацією лікаря після оцінки співвідношення ризик/користь.

Передозування.

Не спостерігалось.

Побічні реакції.

Алергічні реакції.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубі у пачці з картону або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua