

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГАСТРОФІТ

Склад:

діючі речовини: 1 упаковка (50 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: солодки коренів (*Liquiritiae radix*) 4 г, софори японської плодів (*Sophorae japonicae fructus*) 4 г, алтеї коренів (*Althaeae radix*) 3,5 г, кропиви листя (*Urticae folium*) 3,5 г, м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folium*) 3,5 г, нагідок квіток (*Calendulae flos*) 3,5 г, ромашки квіток (*Matricariae flos*) 3,5 г, цмину піщаного квіток (*Helichrysi arenarii flos*) 3,5 г, шипшини плодів (*Rosae pseudo-fructus*) 3,5 г, аїру коренів (*Calami radix*) 3 г, бузини квіток (*Sambuci flos*) 3 г, деревію трави (*Millefolii herba*) 3 г, звіробою трави (*Hyperici herba*) 3 г, шавлії лікарської листя (*Salviae officinalis folium*) 3 г, полину гіркого трави (*Absinthii herba*) 2,5 г.

Лікарська форма. Збір.

Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору із коричнювато-червоними, оранжевими, жовтими і білими включеннями. Запах слабкий, приємний.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси.

Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

ГАСТРОФІТ проявляє спазмолітичні властивості, стимулює репаративні процеси у слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки, регулює функції травного тракту, нормалізує моторику кишечника. Має також жовчогінну та вітрогінну дію.

Клінічні характеристики.

Показання. Хронічний гастрит зі збереженою або зниженою кислотоутворювальною функцією шлунка; функціональна диспепсія; дуоденіт; профілактика рецидивів та у складі комплексного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, коліту.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу.

Гіпертонічна хвороба ІІБ-ІІІ ступенів, гостра та хронічна серцева недостатність, гіпокаліємія, обтураційна жовтяниця, жовчнокам'яна хвороба з наявністю каменів понад 10 мм у діаметрі, гострий холецистит, гострий гепатит, цироз печінки, гострий панкреатит, круп, обструктивний бронхіт, спазмофілія, тромбофлебіт, підвищене згортання крові.

Особливі заходи безпеки. Під час лікування слід уникати інтенсивного УФ-випромінювання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При тривалому застосуванні одночасно з серцевими глікозидами, адренкортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), проносними засобами, тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного балансу.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Лікарський засіб протипоказаний у період вагітності. При необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. У період застосування лікарського засобу слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій (керування транспортними засобами та робота зі складними механізмами).

Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 1 години, процідити.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по $\frac{2}{3}$ склянки (150 мл) за 20-30 хвилин до їди 3 рази на добу.

Тривалість застосування визначає лікар. У середньому курс лікування становить від 1 до 2 місяців, при необхідності курс можна повторити.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Передозування. Можливе посилення проявів побічних реакцій, диспептичні явища, набряки, підвищення артеріального тиску.

Побічні реакції. Лікарський засіб зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, з огляду на його багатокomпонентний склад, здебільшого при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого з компонентів або при порушенні режиму прийому, можливі алергічні реакції, зокрема свербіж, висипання, кропив'янка, дерматит, набряк шкіри, фоточутливість. У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C та недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 г у пакеті, вкладеному в пачку.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГАСТРОФІТ

Склад:

діючі речовини: 1 упаковка (100 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: солодки коренів (*Liquiritiae radix*) 8 г, софори японської плодів (*Sophorae japonicae fructus*) 8 г, алтеї коренів (*Althaeae radix*) 7 г, кропиви листя (*Urticae folium*) 7 г, м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folium*) 7 г, нагідок квіток (*Calendulae flos*) 7 г, ромашки квіток (*Matricariae flos*) 7 г, цмину піщаного квіток (*Helichrysi arenarii flos*) 7 г, шипшини плодів (*Rosae pseudo-fructus*) 7 г, аїру коренів (*Calami radix*) 6 г, бузини квіток (*Sambuci flos*) 6 г, деревію трави (*Millefolii herba*) 6 г, звіробою трави (*Hyperici herba*) 6 г, шавлії лікарської листя (*Salviae officinalis folium*) 6 г, полину гіркого трави (*Absinthii herba*) 5 г.

Лікарська форма. Збір.

Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору із коричнюватими, червоними, оранжевими, жовтими і білими включеннями. Запах слабкий, приємний.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси.

Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

ГАСТРОФІТ проявляє спазмолітичні властивості, стимулює репаративні процеси у слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки, регулює функції травного тракту, нормалізує моторику кишечника. Має також жовчогінну та вітрогінну дію.

Клінічні характеристики.

Показання. Хронічний гастрит зі збереженою або зниженою кислотоутворювальною функцією шлунка; функціональна диспепсія; дуоденіт; профілактика рецидивів та у складі комплексного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, коліту.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу. Гіпертонічна хвороба ІІБ-ІІІ ступенів, гостра та хронічна серцева недостатність, гіпокаліємія,

обтураційна жовтяниця, жовчнокам'яна хвороба з наявністю каменів понад 10 мм у діаметрі, гострий холецистит, гострий гепатит, цироз печінки, гострий панкреатит, круп, обструктивний бронхіт, спазмофілія, тромбофлебіт, підвищене згортання крові.

Особливі заходи безпеки. Під час лікування слід уникати інтенсивного УФ-випромінювання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При тривалому застосуванні одночасно з серцевими глікозидами, адренкортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), проносними засобами, тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного балансу.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Лікарський засіб протипоказаний у період вагітності. При необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. У період застосування лікарського засобу слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій (керування транспортними засобами та робота зі складними механізмами).

Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 1 години, процідити.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по $\frac{2}{3}$ склянки (150 мл) за 20–30 хвилин до їди 3 рази на добу.

Тривалість застосування визначає лікар. У середньому курс лікування становить від 1 до 2 місяців, при необхідності курс можна повторити.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Передозування. Можливе посилення проявів побічних реакцій, диспептичні явища, набряки, підвищення артеріального тиску.

Побічні реакції. Лікарський засіб зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, з огляду на його багатокомпонентний склад, здебільшого при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого з компонентів або при порушенні режиму прийому, можливі алергічні реакції, зокрема свербіж, висипання, кропив'янка, дерматит, набряк шкіри, фоточутливість. У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C та недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 г у пакеті, вкладеному в пачку.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГАСТРОФІТ

Склад:

діючі речовини: 1 фільтр-пакет (1,5 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: солодки коренів (*Liquiritiae radix*) 120 мг, софори японської плодів (*Sophorae japonicae fructus*) 120 мг, алтеї коренів (*Althaeae radix*) 105 мг, кропиви листя (*Urticae folium*) 105 мг, м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folium*) 105 мг, нагідок квіток (*Calendulae flos*) 105 мг, ромашки квіток (*Matricariae flos*) 105 мг, цмину піщаного квіток (*Helichrysi arenarii flos*) 105 мг, шипшини плодів (*Rosae pseudo-fructus*) 105 мг, аїру коренів (*Calami radix*) 90 мг, бузини квіток (*Sambuci flos*) 90 мг, деревію трави (*Millefolii herba*) 90 мг, звіробою трави (*Hyperici herba*) 90 мг, шавлії лікарської листя (*Salviae officinalis folium*) 90 мг, полину гіркого трави (*Absinthii herba*) 75 мг.

Лікарська форма. Збір.

Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору із коричнювато-червоними, оранжевими, жовтими і білими включеннями. Запах слабкий, приємний.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси.

Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

ГАСТРОФІТ проявляє спазмолітичні властивості, стимулює репаративні процеси у слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки, регулює функції травного тракту, нормалізує моторику кишечника. Має також жовчогінну та вітрогінну дію.

Клінічні характеристики.

Показання. Хронічний гастрит зі збереженою або зниженою кислотоутворювальною функцією шлунка; функціональна диспепсія; дуоденіт; профілактика рецидивів та у складі комплексного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, коліту.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу. Гіпертонічна хвороба ІІБ-ІІІ ступенів, гостра та хронічна серцева недостатність, гіпокаліємія, обтураційна жовтяниця, жовчнокам'яна хвороба з наявністю каменів понад 10 мм у діаметрі, гострий холецистит, гострий гепатит, цироз печінки, гострий панкреатит, круп, обструктивний бронхіт, спазмофілія, тромбофлебіт, підвищене згортання крові.

Особливі заходи безпеки. Під час лікування слід уникати інтенсивного УФ-випромінювання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При тривалому застосуванні одночасно з серцевими глікозидами, адренкортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), проносними засобами, тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного балансу.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Лікарський засіб протипоказаний у період вагітності. При необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. У період застосування лікарського засобу слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій (керування транспортними засобами та робота зі складними механізмами).

Спосіб застосування та дози. 2 фільтр-пакети залити 150 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 15 хвилин.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по 150 мл за 20-30 хвилин до їди 3 рази на добу.

Тривалість застосування визначає лікар. У середньому курс лікування становить від 1 до 2 місяців, при необхідності курс можна повторити.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Передозування. Можливе посилення проявів побічних реакцій, диспептичні явища, набряки, підвищення артеріального тиску.

Побічні реакції. Лікарський засіб зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, з огляду на його багатокомпонентний склад, здебільшого при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого з компонентів або при порушенні режиму прийому, можливі алергічні реакції, зокрема числі свербіж, висипання, кропив'янка, дерматит, набряк шкіри, фоточутливість. У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності,

зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 1,5 г у фільтр-пакеті № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».