

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

### **ЕУФОРБІУМ КОМПОЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С**

**(EUPHORBIIUM COMPOSITUM® NASENTROPFEN S)**

**Склад:** діючі речовини: 100 г препарату містять: Argentum nitricum D10 – 1 г, Euphorbium D4 – 1 г, Hepar sulfuris D10 – 1 г, Hydrargyrum biiodatum D8 – 1 г, Luffa operculata D2 – 1 г, Mucosa nasalis suis D8 – 1 г, Pulsatilla pratensis D2 – 1 г, Sinusitis Nosode D13 – 1 г;

допоміжні речовини: бензалконію хлориду розчин, натрію гідрофосфат дигідрат, натрію хлорид, натрію дигідрофосфат дигідрат, вода очищена.

**Лікарська форма.** Спрей назальний.

**Основні фізико-хімічні властивості:** від прозорого до злегка опалесцентного, від безбарвного до злегка світло-жовтого кольору розчин, запах нейтральний.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

### **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Препарат чинить протинабрякову, протизапальну, противірусну, імунокоригуючу та протиалергічну дії, що базуються на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.

**Клінічні характеристики.**

### **Показання.**

Риніти різного походження (вірусні, бактеріальні, алергічні) та видів (вазомоторні, сухі, гіперпластичні та атрофічні). Гострий та хронічний синусит. Озена (як додатковий засіб).

### **Протипоказання.**

Гіперчутливість до бензалконію хлориду та до інших компонентів препарату.

## ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Препарат сумісний з іншими лікарськими засобами.

### ***Особливості застосування.***

У перші кілька днів застосування препарату інколи можливе короткочасне збільшення секреції з носа, що є доброю ознакою і не потребує припинення лікування.

При утримуванні симптомів або погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

Цей лікарський засіб містить 0,012 мг бензалконію хлориду в 1 впорскуванні, що еквівалентно 1 мг / 10 г. Бензалконію хлорид може викликати подразнення або набряк слизової оболонки носа, особливо при тривалому застосуванні.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Через недостатність належного задокументованого досвіду питання щодо доцільності застосування препарату у період вагітності або годування груддю вирішує лікар індивідуально з урахуванням співвідношення користь-ризик.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*** Випадки впливу невідомі.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1-2 впорскування у кожен ніздрю 3-5 разів на добу; дітям віком від 2 років до 6 років – 1 впорскування 3-4 рази на добу.

Курс лікування: 2-6 тижнів.

***Діти.*** Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 2 років (за призначенням

лікаря).

**Передозування.** Не відзначалося.

**Побічні реакції.** Можливий розвиток алергічних реакцій у випадку підвищеної чутливості до компонентів препарату.

У дуже рідкісних випадках після застосування препарату може спостерігатися подразнення слизової оболонки носа з відчуттям печіння та гіперсекрецією. У таких випадках застосування лікарського засобу слід припинити.

У дуже рідкісних випадках у пацієнтів зі схильністю до бронхіальної астми прийом препарату може спричинити бронхоспазм через наявність у складі препарату бензалконію хлориду.

**Термін придатності.** 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

**Умови зберігання.** Лікарський засіб не потребує особливих умов зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці!

**Упаковка.** Розпилювач на 20 мл у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.