

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

**СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %**

**(ALCOHOL ETHYL 70 %)**

### **Склад:**

*діюча речовина:* етанол;

не менше 69,3 % об./об. і не більше 70,7 % об./об. етанолу, а також вода.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина.  
Гігроскопічна.

### **Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби.

Код АТХ D08A X08.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.

### ***Протипоказання.***

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.

### ***Особливі заходи безпеки.***

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння лікарського засобу в очі.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.***

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

### ***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Зовнішньо — для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук.

Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1 : 1.

*Діти.*

Застосовують за призначенням лікаря.

***Передозування.***

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

***Побічні реакції.***

При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

***Термін придатності.***

5 років.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці. Берегти від вогню.

***Упаковка.***

По 100 мл у флаконах скляних.

***Категорія відпуску.***

За рецептом.

***Виробник.***

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

***Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.***

Україна, 61010, Харківська обл., м. Харків, вул. Гордієнківська, буд.1.