

# ІНСТРУКЦІЯ

## для медичного застосування лікарського засобу

### ГУНА-ПРОГЕСТЕРОН

#### **Склад:**

*діюча речовина:* 100 мл крапель оральних містять: Progesterone D6 100 мл;

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 30 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору з запахом спирту етилового.

**Фармакотерапевтична група.** Гомеопатичний лікарський засіб.

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Згідно з концепцією фізіологічної регуляційної медицини, *Progesterone D6* стимулює синтез ендogenous прогестерону в жіночому організмі та відновлює чутливість прогестеронових рецепторів в органах-мішенях. За рахунок динамічної активації в процесі приготування та доведення до концентрації, ідентичної концентрації гормону в міжклітинному матриксі організму, ГУНА-ПРОГЕСТЕРОН досягає ефектів регуляції, стимуляції синтезу ендogenous прогестерону та відновлення рецепторної чутливості до нього. Прогестерон – гормон жовтого тіла, гестаген. Викликає зміни в ендометрії, готуючи його до імплантації заплідненої яйцеклітини, забезпечує нормальний перебіг вагітності, блокує скорочуваність матки, особливо вагітної, впливає на розвиток молочних залоз.

*Фармакокінетика.*

Не застосовується для гомеопатичного лікарського засобу.

## **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

Недостатність синтезу ендogenousного прогестерону. Лікування гіперестрогенемії, в тому числі при синдромі полікістозних яєчників. Передменструальний синдром.

### ***Протипоказання.***

Вагінальна кровотеча невідомої етіології. Наявність злоякісної пухлини молочної залози і репродуктивних органів або підозра на її наявність. Захворювання печінки і печінкова недостатність. Тромбофлебіт та тромбоемболія в анамнезі. Гіперчутливість до прогестерону або етанолу.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Прогестерон ослаблює дію препаратів, що стимулюють скорочення міометрія (окситоцин, пітуїтрин), анаболічних стероїдів (ретаболіл, неробол), гонадотропних гормонів гіпофіза. При взаємодії з окситоцином зменшується лактогенний ефект. Посилює дію діуретиків, гіпотензивних препаратів, імунодепресантів, бромкриптину і системних коагулянтів. Знижує ефективність антикоагулянтів.

### ***Особливості застосування.***

Під час прийому лікарського засобу рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Протипоказаний для застосування під час вагітності та у період годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

В рекомендованих дозах не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

20 крапель двічі на добу зі столовою ложкою (15 мл) води. Приймати за 15 хвилин до прийому їжі або натще. Курс лікування – 3–6 місяців. При необхідності курс може бути продовжений після консультації з лікарем.

Лікування гіперестрогенемії, в тому числі при синдромі полікістозних яєчників – з 15 по 24 день менструального циклу. Курс лікування – 3-6 місяців. При необхідності курс може бути продовжений після консультації з лікарем.

Передменструальний синдром, альгодисменорея – прийом препарату починають за 8 днів до початку менструації і припиняють з її закінченням.

Зберігати якнайдалі від джерел електромагнітних хвиль: телевізора, мобільного телефона, НВЧ-печі, музичного центру тощо.

### ***Діти.***

Застосовують дівчатам після настання статевого дозрівання.

### ***Передозування.***

Не виявлено.

### ***Побічні реакції.***

Можуть виникати короточасні симптоми гіперсалівації та нудоти.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.

### ***Термін придатності.***

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### ***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище

25 °С.

### ***Упаковка.***

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

### ***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

**Виробник.** Гуна С.п.а

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Віа Пальманова, 69 - 20132 Мілан, Італія