

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЛИСТЯ

(MENTHAЕ PIPERITAE FOLIA)

Склад:

діюча речовина: м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*);

1 пачка містить м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*) 50 г;

1 фільтр-пакет містить м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*) 1,5 г.

Лікарська форма. Листя.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя різної форми з домішками шматочків стебел від світло-зеленого до темно-зеленого або коричнювато-зеленого кольору, іноді з коричнювато-фіолетовими краплями.

Фармакотерапевтична група. Протиблювальні засоби і препарати, що усувають нудоту.

Код АТХ А04А D.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, седативну і слабку гіпотензивну дію; підвищують секрецію травних залоз, збуджують апетит, пригнічують процеси гниття і бродіння у травному каналі, знижують тонус гладеньких м'язів кишечника, жовчо- та сечовивідних шляхів, посилюють виділення жовчі.

Клінічні характеристики.

Показання. Захворювання травного тракту (нудота різного походження, кишкові коліки, метеоризм, спазми травного тракту); захворювання печінки (холецистит, гепатит, холангіт, жовчокам'яна хвороба), як легкий заспокійливий засіб (у складі комплексної терапії).

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Спазмофілія, круп, бронхіальна астма.

Особливі заходи безпеки. Пацієнтам з шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування листя м'яти перцевої, оскільки може посилитися печія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплого вигляді 2-3 рази на добу за 15 хв до їди: дорослим та дітям віком від

14 років – по ½-⅓ склянки, дітям віком 12-14 років – по ¼ склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити

і настоювати 15 хв. Приймати у теплого вигляді 3-4 рази на добу за 15 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 склянці, дітям віком 12-14 років – по ½ склянки, 7-12 років – по ⅓ склянки, 3-7 років – по 2 столові ложки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування. Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця. Терапія симптоматична.

Побічні реакції. Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.