

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

Склад:
діючі речовини: іотіксан;
1 флакон містить 8 мг лорноксикаму;
допоміжні речовини: маніт (E 421), триметамол, динатрію едетат.

Содержание: философия, литература, искусство, наука, жизнь и общество.

Фармакологічні властивості

Лорновским с нестероидным противовоспалительным свойством

У зв'язку з медичним підозрюванням штучно-кишкового тракту і системного ушкодження дією, пов'язаного з загубуванням синтетичної протизадишки (РГ), застосування лоріоксикаму, як і інших НПЗЗ, часто призводить до розвитку штучно-кишкового ускладнення.

Розподіл. У плазмі крові порфеноксимон з'являється у незначимому стані та у неактивній формі свого гідроксильованого метаболіту. Зв'язування порфеноксимону з білками плазми крові становить 99 % і не залежить від його концентрації. Він також виявляється в сироватковій рідині після повторного застосування.

При дослідженнях на моделях тварин лореноксамом не спрочинено відукати початкових ферментів. На підставі результатів клінічних досліджень не отримано даних про кумуляцію лореноксаму після багаторазового прийому рекомендованих доз. Ці результати були підтверджені даними моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів при дослідженнях протягом 1 року.

Немає істотної зміни кінетичного профілю пероксисмакту у пацієнтів із нирковою або печінковою недостатністю, за винятком кумуляції, у пацієнтів з хронічним захворюванням печінки після 7 днів терапії з застосуванням добових доз 12 мг та 16 мг.

Показатели.

Противопоказания.

- гіперкоагуляція (схильність до тромбозів);

