

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### МЕНОВАЗИН

#### **Склад:**

діючі речовини: 100 мл розчину містить бензокаїну 1 г, прокаїну гідрохлориду 1 г, ментолу рацемічного 2,5 г.

допоміжна речовина: етанол 70 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора безбарвна рідина із запахом ментолу.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

**Код АТХ** M02A X.

#### **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Препарат має протисвербіжну дію та місцевоанестезуючий ефект. При нанесенні на шкіру та слизові оболонки спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання.

Чинить легку знеболювальну дію.

**Фармакокінетика.**

При місцевому застосуванні препарат не надходить до кров'яного русла.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Препарат призначають при невралгіях, міалгіях, артралгіях.

##### **Протипоказання.**

Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до новокаїну та інших складових компонентів препарату.

### ***Особливі заходи безпеки.***

Не наносити на ушкоджену шкіру та шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Компоненти препарату (новокаїн, анестезин) послаблюють антибактеріальну дію сульфаніламідних препаратів. Посилюють ефекти препаратів з місцевоанестезуючою дією.

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

### ***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Препарат застосовують зовнішньо. Болісні ділянки шкіри розтирають Меновазином 2–3 рази на добу. Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефекту препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).

### ***Діти.***

Не застосовують дітям віком до 12 років.

***Передозування.***

При тривалому застосуванні можливі запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску, алергічні реакції. При появі таких симптомів препарат слід відмінити, залишки змити з поверхні шкіри водою, провести симптоматичну терапію.

***Побічні реакції.***

Можливі алергічні реакції (гіперемія, подразнення шкіри, відчуття свербіж, висипи, набряк, кропив'янка).

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

***Термін придатності. 2 роки.***

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

***Умови зберігання.***

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 40 мл у флаконах або у флаконах з механічними розпилювачами, у пачці або без пачки.

***Категорія відпуску. Без рецепта.***

***Виробник.***

ТОВ «Мікрофарм».

***Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.***

ТОВ «Мікрофарм».

Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20.

**Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/  
місцезнаходження заявника.**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.