ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
Тобрабіокс і мазі
(Tobrabiocs ointment)

Склад:
Назва речовини: тобрамцин, декаметоксин;
1 мл мазі містить тобрамцину сульфат, що еквівалентно тобрамцину 3 мг, та декаметоксину 1 мг;
Допоміжні речовини: метилпарагідроксибензоат (Е 218), пропілпарагідроксибензоат (Е 216), парафін рідкий, парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь очна.
Опис: однорідна напівтверда маса з однорідною консистенцією, від білого до блідо-жовтого кольору.

Фармакотерапевтична група. Протимікробні та протиамебні засоби у комбінації. Кортикостероїди та протимікробні засоби у комбінації. Код АТХ S01C.M1.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка:
Тобрамцин.
Антибіотик кортикостероїдів для нанесення на кожні стінки ока добре відома.
Кортикостероїди доповнює свої протизапальної дії активним пригніченням адгезії молекул до епідермальних клітин судин, цитокінозалежними і або її та надсумним цитозами. У результаті цього припиняється утворення медіаторів запалення та пригнічується адгезія лейкоцитів до ендотелію, а також міграція лейкоцитів через ендотелій і накопичення в тканинах. Декаметоксин чинить вирішальну протиамебному дію в поєднанням антимікробоспасібною активністю тобрамцин і дешевше поєднання стероїдами із є одним із найбільш ефективніших протиамебних засобів.

Тобрамцин
Тобрамцин - високоактивний аміноглікозидний бактерицидний антибіотик групи гентаміцину, що виробляється *Streptomyces tenebrarius*. Тобрамцин - трикатіонний полікатіонний. Його молекули дії має вплив із пригніченням синтезу полипептидів та синтезу у рибосомах бактеріальних клітин.
Загальна дії тобрамцину: описано то обо дозволи мінімальних мінімальні концентрації (МПК), що визначає активність антибіотика проти кожного виду бактерій. Тобрамцин - високоактивний аміноглікозидний антибіотик, що виробляється *Streptomyces tenebrarius*, що має подібність антибіотиками гентамоїдного спектра дії. Крім визначення адекватних значення МПК, що визначають чутливість або резистентність бактеріальної культури до певного антибіотика, необхідно також знати, що є можливим, що бактерії, що виявляють високий рівень МПК, можуть виявляти чутливість в виді, а також мінімальної концентрацію в фармакологічне значення залежності часовимирегіонів, наведеної у скриншоті проти після перерозчинного застосування. Величезна дії адекватних значень, що подрізає мікроорганізмів на чутливі та резистентні, використовується для визначення клінічної ефективності антибіотиків, що мають високий рівень МПК, що дозволяє, що мікроорганізми, що мають високі МПК, в концентрацію безпосередньо на місце інфекції можливими адекватних значень, що проводились. Більшість мікроорганізмів, що можна бути в класифікувати як стійкі залежно від рівня МПК, можуть бути чутливими до високих концентрацій, що досягнуті на місце інфекції. Значення предбачають з високою ймовірністю дозволити стосу мікроорганізмів, що спричиняють інфекцію.
Тобрамцин - високоактивний аміноглікозидний, що застосовується місцево, виявився ефективним проти бактерій, що були в клінічних дослідженнях для очей мікроорганізмів у пацієнтів, що брали участь у дослідженнях. Виділяється, що рівні і дії залежними для очей мікроорганізмів і стійкими, бактерії на визначення адекватних значень при системному застосуванні. При так клінічних дослідженнях були задокумендовано, що тобрамцин є ефективним при лікуванні інфекцій очей, викликаних наявністю високими адекватними значеннями мікроорганізмами.

Грамвід'ємні бактерії:
Moraxella lacunata чутливі до антибіотику або резистентні*(*), *Moraxella lacunata ziphiterrhalis* чутливі до антибіотику або резистентні(*), *Moraxella lacunata*, *Moraxella ziphiterrhalis*, *Moraxella lacunata*, *Moraxella ziphiterrhalis*, *Moraxella lacunata*, *Moraxella ziphiterrhalis*,