

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ТЕНОТЕН

#### **Склад:**

*діюча речовина:* 1 таблетка містить антитіла до мозкоспецифічного білка S-100 афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C200 – 3 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці нанесено риску, на іншому плоскому боці нанесено напис TENOTEN.

**Фармакотерапевтична група.** Гомеопатичний препарат.

#### **Фармакологічні властивості.**

Лікарський засіб проявляє заспокійливу, протитривожну (анксіолітичну) дію, не викликаючи небажаної гіпногенної та міорелаксантиї дії. Покращує переносимість психоемоційних навантажень. Має стресопротекторну, ноотропну, антиамнестичну, протигіпоксичну, нейропротекторну, антиастенічну, антидепресивну дії.

В умовах інтоксикації, гіпоксії, при станах після гострого порушення мозкового кровообігу чинить нейропротекторну дію, обмежує зону ушкодження, поліпшує процеси навчання та пам'яті у центральній нервовій системі (ЦНС).

Інгібує процеси перекисного окиснення ліпідів.

Модифікує функціональну активність білка S-100, який здійснює у мозку поєднання синаптичних (інформаційних) та метаболічних процесів. Чинить ГАМК-міметичну та нейротрофічну дію, підвищує активність стреслімітуючих систем, сприяє відновленню процесів нейрональної пластичності.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Невротичні та неврозоподібні стани, психосоматичні захворювання; стресорні розлади з підвищеною нервовою напруженістю, дратівливістю, тривогою та вегетативними реакціями.

Помірно виражені органічні порушення ЦНС, у тому числі травматичного та дисциркуляторного походження, які супроводжуються нестійкістю емоційного фону, дратівливістю, зниженням пам'яті, вегетативними порушеннями.

### ***Протипоказання.***

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів лікарського засобу; вагітність або період годування груддю.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Випадків взаємодії з іншими лікарськими засобами не виявлено.

### ***Особливості застосування.***

До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам із вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.

У зв'язку з активуючою дією препарату останній прийом слід здійснювати не пізніше як за 2 години до сну.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Дані про ефективність та безпеку застосування препарату в період вагітності або годування груддю відсутні, тому його не слід призначати в ці періоди.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Препарат не чинить седативної дії, тому не впливає на швидкість реакції.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Препарат приймати внутрішньо. Не застосовувати препарат разом з їжею. Застосовувати по 1 або 2 таблетки на прийом. Таблетку тримати у роті (бажано не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.

Препарат приймати 2 рази на добу; у разі необхідності – до 4 прийомів на добу. Курс

лікування – 1-3 місяці; при необхідності курс лікування можна продовжити до 6 місяців або повторити через 1-2 місяці.

При відсутності стійкого покращення стану протягом 3-4 тижнів після початку лікування необхідно звернутися за консультацією до лікаря.

*Діти.*

Препарат у даній лікарській формі не застосовувати дітям.

### ***Передозування.***

При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені допоміжними речовинами, що входять до складу препарату.

### ***Побічні реакції.***

Можливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату.

### ***Термін придатності.***

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### ***Умови зберігання.***

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### ***Упаковка.***

По 20 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці.

### ***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

**Виробник.**

ЗАТ Сантоніка.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Вул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунаське м. сам., LT-46353, Литва.

**Заявник.**

ТОВ "Матеріа Медика-Україна".

**Місцезнаходження заявника.**

Україна, 03062, м. Київ, вул. Нивська, буд. 20,

тел.: 380 (44) 400-90-78.