

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Алтейка-тернофарм

Склад:

діюча речовина: алтейного кореня екстракт сухий (4:1);

5 мл сиропу містять алтейного кореня екстракту сухого (*Althaeae radix extractum siccum*) (4:1) (екстрагент – вода) в перерахунку на полісахариди 7,5 мг;

допоміжні речовини: натрію метилпарабен (Е 219), натрію пропілпарабен (Е 217), кислоти лимонної моногідрат, цукор кондитерський, вода очищена.

Лікарська форма. Сироп.

Основні фізико-хімічні властивості: сиропоподібна рідина від світло-коричневого до червоно-бурого кольору зі специфічним запахом. У процесі зберігання допускається випадання осаду.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовують при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Корені алтеї.

Код АТХ R05C A05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Відхаркувальний засіб прямої дії. Рослинний препарат, основними діючими речовинами якого є полісахариди, а також пектини, амінокислоти, крохмаль тощо. Полісахариди препарату всмоктуються у кров, частково виділяються бронхіальними залозами і чинять на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів обволікаючу, пом'якшувальну і протизапальну дію, деякою мірою збільшуючи виділення рідкої складової бронхіального секрету і нормалізуючи її реологічні властивості (в'язкість, еластичність, адгезивність). Посилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Комплексне лікування гострих і хронічних запальних захворювань органів дихання: ларингіти, трахеїти, бронхіти, бронхіальна астма, коклюш.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (наприклад кодеїном).

Особливості застосування.

Наявність у складі лікарського засобу натрію метилпарабену (Е 219) та натрію пропілпарабену (Е 217) може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лікарський засіб не застосовують, оскільки інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Застосування препарату зазвичай не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Препарат приймають до їди.

Дорослим та дітям від 14 років – по 15 мл сиропу 4-6 разів на добу.

Дітям 6-14 років – по 10 мл сиропу 4-6 разів на добу.

Дітям 2-6 років – по 5 мл сиропу 4-6 разів на добу.

Дітям віком від 2 до 6 років визначену дозу сиропу розводять у необхідній кількості кип'яченої води (10-15 мл).

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально, залежно від ефективності терапії, і зазвичай становить 7-14 днів.

Діти.

Препарат застосовують дітям від 2 років.

Передозування.

Випадки передозування препарату не описані.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції, посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування препаратом та звернутися до лікаря.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Після розкриття зберігати не більше 14 діб при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою мірною або стаканом мірним у пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/
місцезнаходження заявника.**

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua