

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

УГРИН®

(UGRIN)

Склад:

діючі речовини: 100 мл препарату містять настойки (1:10) з суміші лікарської рослинної сировини «Угрин®»: millefolii herba (деревію трава) 1,5 г; menthae folia (м'яти листя) 1,5 г; calendulae officinalis flores (нагідків квітки) 1,5 г; tanacetii flores (пижма квітки) 1,5 г; lavandulae herba (лаванди трава) 1,0 г; chelidoni herba (чистотілу трава) 1,0 г; chamomillae recutitae flores (ромашки квітки) 2,0 г; (екстрагент: етанол 40 %).

допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина червоно-бурого кольору з духмяним специфічним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.

Фармакотерапевтична група. Інші дерматологічні препарати.

Код АТХ D11A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Лікувально-гігієнічний засіб для догляду за шкірою обличчя. Угрин® чинить виражену ранозагоювальну, протизапальну та антимікробну дію за рахунок компонентів, що входять до його складу. Не спричиняє явищ запалення, гіперемії, подразнення шкіри, в той же час зберігає її гідрофільність.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.

Клінічні характеристики.

Показання.

Вугровий висип і жирна себорея обличчя легкої і середньої тяжкості (лікування та профілактика), піодермія, дерматити.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Бронхіальна астма.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат посилює дію протизапальних, репаративних та антимікробних засобів. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Для запобігання виникнення побічних ефектів при застосуванні слід дотримуватися рекомендацій, викладених у розділі «Спосіб застосування та дози».

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лікарський засіб не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю, оскільки на сьогодні немає достатніх даних щодо безпеки його застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати зовнішньо. При вугровому висипі і жирній себорей обличчя уражені ділянки шкіри протирати ватним тампоном, змоченим препаратом, 3-5 разів на добу, не змиваючи і не витираючи протягом 1,5-2 годин. Хворим рекомендується не видавлювати вугрі. Курс лікування – 3-15 днів. Через 10-15 днів курс лікування можна повторити. Під час лікування шкіру обличчя вранці та ввечері потрібно мити теплою водою і дитячим милом, обов'язково ополіскуючи холодною водою.

При дерматитах і піодермії препарат наносити на уражені ділянки шкіри рівним шаром 3-5 разів на добу. Курс лікування – 1 місяць. У разі необхідності курс лікування можна повторити.

Як профілактичний засіб Угрин® застосовувати таким чином: ватним тампоном, змоченим препаратом, протирати жирну та нормальну шкіру обличчя 1-3 рази на добу.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Діти. Препарат не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років, оскільки до його складу входить етанол 40 %.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні реакції.

При підвищеній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення алергічних реакцій, у тому числі гіперемія, свербіж шкіри, висипання, кропив'янка, контактний дерматит, набряк Квінке, анафілактичний шок.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл у флаконі або банці. По 1 флакону або банці у пачці з картону.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

УГРИН®

(UGRIN)

Состав:

действующие вещества: 100 мл препарата содержат настойки (1:10) из смеси лекарственного растительного сырья «Угрин®»: millefolii herba (тысячелистника трава) 1,5 г; menthae folia (мяты листья) 1,5 г; calendulae officinalis flores (календулы цветки) 1,5 г; tanacetii flores (пижмы цветки) 1,5 г; lavandulae herba (лаванды трава) 1,0 г; chelidoni herba (чистотела трава) 1,0 г; chamomillae recutitae flores (ромашки цветки) 2,0 г; (экстрагент: этанол 40 %).

вспомогательные вещества: отсутствуют, кроме экстрагента.

Лекарственная форма. Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость красно-бурого цвета с душистым специфическим запахом. При хранении допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие дерматологические препараты.

Код АТХ D11A X.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Лечебно-гигиеническое средство по уходу за кожей лица. Угрин® оказывает выраженное ранозаживляющее, противовоспалительное и антимикробное действие за счет компонентов, входящих в его состав. Не вызывает явлений воспаления, гиперемии, раздражений кожи, в то же время сохраняет ее гидрофильность.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Клинические характеристики.

Показания.

Угревая сыпь и жирная себорея лица легкой и средней тяжести (лечение и профилактика), пиодермия, дерматиты.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к любому из компонентов лекарственного средства.
Бронхиальная астма.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Препарат усиливает действие противовоспалительных, репаративных и антимикробных средств. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения.

Для предупреждения возникновения побочных эффектов при применении следует придерживаться рекомендаций, изложенных в разделе «Способ применения и дозы».

Применение в период беременности или кормления грудью.

Лекарственное средство не рекомендуется применять в период беременности или кормления грудью, так как в настоящее время нет достаточных данных относительно безопасности его применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

Применять наружно. При угревой сыпи и жирной себорее лица пораженные участки кожи протирать ватным тампоном, смоченным препаратом, 3-5 раз в сутки, не смывая и не вытирая на протяжении 1,5-2 часов. Больным рекомендуется не выдавливать угри. Курс лечения – 3-15 дней. Через 10-15 дней курс лечения можно повторить. Во время лечения кожу лица утром и вечером необходимо мыть теплой водой и детским мылом, обязательно ополаскивая холодной водой.

При дерматитах и пиодермии препарат наносить на пораженные участки кожи ровным слоем 3-5 раз в сутки. Курс лечения – 1 месяц. В случае необходимости курс лечения можно повторить.

Как профилактическое средство Угрин® использовать таким образом: ватным тампоном, смоченным препаратом, протирать жирную и нормальную кожу лица 1-3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально.

Дети. Препарат не рекомендуется применять детям до 12 лет, поскольку в его состав входит этанол 40 %.

Передозировка.

Не выявлено.

Побочные реакции.

При повышенной чувствительности к компонентам препарата возможно возникновение аллергических реакций, в том числе гиперемия, зуд кожи, высыпания, крапивница, контактный дерматит, отек Квинке, анафилактический шок.

В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности. 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 100 мл во флаконе или банке. По 1 флакону или банке в пачке из картона.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 61010, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.