

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЙОД (IODINE)

Склад:

діюча речовина: йод;

1 мл розчину містить: йод - 0,05 г;

допоміжні речовини: калію йодид, етанол 96 %, вода очищена.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина червоно-бурого кольору, прозора у тонкому шарі, з характерним запахом.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфекційні засоби.

Код АТХ D08A G03.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Препарат містить елементарний йод, для якого характерні протимікробна, місцевоподразнювальна та відволікаюча дії. При нанесенні на шкіру і слизові оболонки препарат зумовлює подразнювальну дію і може спричинити рефлекторні зміни в діяльності організму. Проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.

Клінічні характеристики.

Показання.

Застосовують зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах, невралгіях (чинить відволікаючу дію).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до йоду. Також препарат протипоказаний при діабетичних, трофічних виразках.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки, може спостерігатися денатурація білкових компонентів.

Несумісний з ефірними маслами, розчином аміаку, брильянтовим зеленим. Несумісний з дезінфікуючими лікарськими засобами, що містять ферменти ртуті, луги, відновники.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Особливості застосування.

Слід бути обережними при застосуванні йоду на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься в препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Не допускати потрапляння препарату в очі. Слід бути особливо обережними при застосуванні йоду у пацієнтів зі світлим волоссям.

Не слід застосовувати на великі ділянки шкіри через можливий розвиток опіку.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не рекомендується застосування препарату у період вагітності та годування груддю через можливий ризик розвитку порушень функції щитовидної залози у плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

При зовнішньому застосуванні йодом змочують ватний тампон, який використовують для обробки уражених ділянок шкіри.

Діти. Не застосовувати новонародженим через можливий ризик розвитку порушень функції щитовидної залози та уражень шкіри.

Передозування.

При передозуванні можливі явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъозотеча, слинотеча, вугрові висипи на шкірі), опіки, подразнення шкіри.

Терапія симптоматична.

Побічні реакції.

Можлива поява нежитю, кропив'янки, набряку Квінке, слино- та слъозотечі, висипів на шкірі, контактного дерматиту.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 мл, або по 20 мл, або по 1000 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ЙОД
(IODINE)

Состав:

действующее вещество: йод;

1 мл раствора содержит: йод - 0,05 г;

вспомогательные вещества: калия йодид, этанол 96 %, вода очищенная.

Лекарственная форма. Раствор для наружного применения, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: жидкость красно-бурого цвета, прозрачная в тонком слое, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфекционные средства.

Код АТХ D08A G03.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Препарат содержит элементарный йод, для которого характерно противомикробное, местнораздражающее и отвлекающее действие. При нанесении на кожу и слизистые оболочки препарат обуславливает раздражающее действие и может вызвать рефлекторные изменения в деятельности организма. Проникая, йод активно влияет на обмен веществ, усиливает процессы диссимиляции.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Клинические характеристики.

Показания.

Применяют наружно как антисептическое, раздражающее средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, для обработки операционного поля, для профилактики инфицирования небольших поражений целостности кожи, для уменьшения воспалительных процессов при миозитах, невралгиях (оказывает отвлекающее действие).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к йоду. Также препарат противопоказан при диабетических, трофических язвах.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, содержащими органические соединения, может наблюдаться денатурация белковых компонентов.

Несовместим с эфирными маслами, раствором аммиака, бриллиантовым зеленым. Несовместим с дезинфицирующими лекарственными средствами, содержащими ферменты ртути, щелочи, восстановители.

При одновременном применении каких-либо других лекарственных средств следует

сообщить врачу.

Особенности применения.

Следует быть осторожными при применении йода на слизистые оболочки, поскольку спирт, содержащийся в препарате, может вызвать ожоги, сильное раздражение. Не допускать попадания препарата в глаза. Следует быть особенно осторожными при применении йода у пациентов со светлыми волосами.

Не следует применять на большие участки кожи из-за возможного развития ожога.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может навредить здоровью.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не рекомендуется применение препарата в период беременности и кормления грудью из-за возможного риска развития нарушений функции щитовидной железы у плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

При наружном применении йодом смачивают ватный тампон, который используют для обработки пораженных участков кожи.

Дети. Не применять новорожденным из-за возможного риска развития нарушений функции щитовидной железы и поражений кожи.

Передозировка.

При передозировке возможны явления йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюнотечение, угревая сыпь на коже), ожоги, раздражение кожи.

Терапия симптоматическая.

Побочные реакции.

Возможно появление насморка, крапивницы, отека Квинке, слюно- и слезотечения, сыпей

на коже, контактного дерматита.

В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности. 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 10 мл, или 20 мл, или по 1000 мл во флаконах.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

Украина, 61010, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.