

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ДУБА КОРА

### (QUERCUS CORTEX)

#### **Склад:**

*діюча речовина:* дуба кора (Quercus cortex);

1 пачка містить дуба кори (Quercus cortex) – 50 г або 100 г; 1 фільтр-пакет містить дуба кори (Quercus cortex) – 1,5 г.

#### **Лікарська форма.** Кора.

*Основні фізико-хімічні властивості:*

подрібнена сировина: шматочки кори різної форми, які проходять крізь сито №5600. Колір темно-бурий, світло-сірий, сріблястий або жовтувато-бурий. Запах слабкий, своєрідний, який посилюється при змочуванні кори водою. Смак сильно в'яжучий;

порошок крупний: шматочки кори різної форми, які проходять крізь сито №1400. Колір темно-бурий, світло-сірий, сріблястий або жовтувато-бурий. Запах слабкий, своєрідний, який посилюється при змочуванні кори водою. Смак сильно в'яжучий.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Засоби для місцевого застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

#### ***Фармакологічні властивості.***

*Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини препарату чинять в'яжучу, протизапальну, протигнілісну дію.

*Фармакокінетика.*

Фармакокінетика не визначалась.

#### **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

Стоматити, гінгівіти, пародонтози, фарингіти, трахеїти та інші запальні захворювання ротової порожнини і горла (у комплексній терапії).

### ***Протипоказання.***

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*** Невідома.

### ***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитина.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

2 столові ложки кори помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хвилин, після чого негайно процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Перед застосуванням відвар збовтати.

Застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 6-8 разів на добу.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хвилин. Застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 6-8 разів на добу, кожного разу використовуючи свіжоприготовлений настій.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

*Діти.*

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

***Передозування.***

Повідомлення відсутні.

***Побічні реакції.***

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

***Термін придатності.*** 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлену водну витяжку – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

***Упаковка.***

По 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах №20.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

***Заявник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

***Місцезнаходження заявника.***

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.