

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГОРОБИНИ ЧОРНОПЛІДНОЇ ПЛОДИ

(ARONIAE MELANOCARPAE FRUCTUS)

### **Склад:**

*діюча речовина:* горобини чорноплідної плоди (*Aroniae melanocarpae fructus*).

**Лікарська форма.** Плоди.

*Основні фізико-хімічні властивості:* плоди яблукоподібні, іноді з плодоніжками, кулясті. Колір плодів чорний, пурпурово-чорний, м'якоть фіолетово-червона, майже чорна.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що діють на метаболізм та на систему травлення. Код АТХ А16А Х.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Застосовувати у комплексній терапії при гіпо- та авітамінозах, геморагічних діатезах, кровотечах різного походження, початкових стадіях артеріальної гіпертензії, тиреотоксикозу, атеросклерозу.

#### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до лікарського засобу. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гіперацидний гастрит, тромбози, тромбофлебіти, підвищена здатність крові до зсідання, виражена артеріальна гіпотензія.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Дія лікарського засобу посилюється при одночасному прийомі рослин із вмістом аскорбінової кислоти (плоди шипшини, чорної смородини).

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

### **Особливості застосування.**

Перед початком лікування слід порадитися з лікарем.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Інформація щодо досвіду застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю відсутня.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Немає даних.

### **Спосіб застосування та дози.**

2 столові ложки плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолоджувати при кімнатній температурі 45-60 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплом вигляді по ½ склянки 3-4 рази на добу після їди. Перед застосуванням настій рекомендується збовтати.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °C) не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

*Діти.* У зв'язку з відсутністю достатніх клінічних даних щодо застосування лікарського засобу дітям, його не слід призначати цій категорії пацієнтів.

**Передозування.** Посилення проявів побічних реакцій. Терапія симптоматична.

**Побічні реакції.** Можливі алергічні реакції в осіб із гіперчутливістю. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов'язково звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

**Упаковка.** По 75 г, або 100 г, або 150 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/  
місцезнаходження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.