

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ТРАУМЕЛЬ С ГЕЛЬ

(TRAUMEEL® S GEL)

Склад: діючі речовини: 100 г препарату містять: Achillea millefolium D0 – 0,09 г; Aconitum napellus D1 – 0,05 г; Arnica montana D3 – 1,5 г; Atropa bella-donna D1 – 0,05 г; Bellis perennis D – 0,1 г; Calendula officinalis D0 – 0,45 г; Echinacea D0 – 0,15 г; Echinacea purpurea D0 – 0,15 г; Hamamelis virginiana D0 – 0,45 г; Hepar sulfuris D6 – 0,025 г; Hypericum perforatum D6 – 0,09 г; Matricaria recutita D0 – 0,15 г; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 – 0,04 г; Symphytum officinale D4 – 0,1 г;

допоміжні речовини: карбомери, етанол 96 %, натрію гідроксид, вода очищена.

Лікарська форма. Гель.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора желатинова маса від коричнюватого до коричнювато-жовто-зеленуватого кольору із запахом етанолу та солодкуватим запахом.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Препарат має протизапальну, аналгетичну, протиексудативну, імунокоригуючу, репаративну дію, яка базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного та мінерального походження, що входять до складу препарату.

Клінічні характеристики.

Показання.

Для тимчасового полегшення болю у суглобах; при симптомах, пов'язаних з травмами (спортивні травми, розтягнення зв'язок, синці); для лікування запальних процесів опорно-рухового апарату та шкіри (наприклад «тенісний» лікоть).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до одного або більше активних компонентів або допоміжних речовин, до арніки, ромашки, деревій звичайний або до інших рослин родини айстрових (складноцвітих).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Випадки взаємодії невідомі. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

Особливості застосування.

Не наноситигель на ділянки великої площі.

При утримуванні симптомів або погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Токсичність у період вагітності або годування груддю гомеопатично розведених речовин, що входять до складу даного лікарського засобу, не встановлена.

Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю тільки після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Випадки впливу невідомі.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям від народженнягель наносити тонким шаром на уражені ділянки 1-2 рази на добу або, у разі необхідності, частіше. Зазвичай 1 см Траумель С Гелю покриває приблизно поверхню 10 см x 10 см (10 см²).

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від ефективності терапії. Середній період лікування становить 10 днів.

Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям від народження за призначенням лікаря.

Передозування. Випадків передозування не відзначали.

Побічні реакції. Зрідка можуть спостерігатися реакції гіперчутливості або місцеві алергічні реакції (шкірні висипання, кропив'янка, запалення шкіри, почервоніння, набрякання чи свербіж), у випадку яких застосування препарату необхідно припинити.

Термін придатності. 3 роки.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка. Туба на 50 г у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.