

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

МАСТО-ГРАН

(MASTO-GRAN)

Склад:

діючі речовини: 10 г гранул містять Conium 30CH 20 мг, Conium 200CH 20 мг, Calcium fluoricum 30CH 20 мг, Asterias rubens 30CH 20 мг, Phytolacca 30CH 20 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули.

Основні фізико-хімічні властивості: гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Властивості зумовлені поєднанням компонентів, що входять до складу лікарського засобу. Сприяє нормалізації метаболізму у тканинах та ендокринних взаємозв'язків між яєчниками і гіпофізом, поліпшенню венозного відтоку, зміцненню імунної системи організму, що створює передумови для зворотного розвитку патологічного процесу при мастопатіях.

Клінічні характеристики.

Показання. У комплексному лікуванні фіброзно-кістозної мастопатії, циклічних та нециклічних мастопатій.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При одночасному

застосуванні препарату з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Особливості застосування. У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини — крупки цукрової — проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Питання про доцільність застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю вирішує лікар індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Дані відсутні.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим жінкам призначати по 5 гранул під язик 1 раз на добу курсами по 3 місяці 2-3 рази на рік.

Гранули слід приймати під язик, тримаючи до повного розсмоктування, за 15-20 хвилин до або через 1 годину після їди. За необхідності гранули можна заздалегідь розчинити у невеликій кількості води.

Діти. Не застосовувати.

Передозування. Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можливі алергічні реакції. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов'язково звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 г у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картону з маркуванням українською мовою.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Тургенєвська, будинок 76-78.