

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### КЛІМАКТ-ХЕЕЛЬ

(KLIMAKT-HEEL<sup>®</sup>)

#### **Склад:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить: Lachesis D12 – 90 мг, Sanguinaria canadensis D3 – 30 мг, Sepia officinalis D4 – 30 мг, Simarouba cedron D4 – 30 мг, Stannum metallicum D12 – 60 мг, Strychnos ignatii D4 – 30 мг, Sulfur D4 – 30 мг;

*допоміжні речовини:* магнію стеарат; лактоза, моногідрат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі плоскі таблетки з фаскою, від білого до оранжево-білого кольору, можливі темні або оранжеві вкраплення, зі специфічним запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.** Препарат має гормонорегулюючу, заспокійливу, спазмолітичну та знеболювальну дію.

Дія препарату базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.

#### **Клінічні характеристики.**

**Показання.** Порушення, пов'язані з клімактеричним періодом (припливи жару, пітливість, посилене серцебиття, запаморочення, розлади сну, депресія, меланхолічний настрій, неврози, судинна дистонія, мігрень).

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

### **Особливості застосування.**

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

У випадках захворювань печінки та/або якщо необхідно застосування у комбінації з гепатотоксичними препаратами препарат застосовувати тільки після консультації з лікарем.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Токсичність у період вагітності або годування груддю гомеопатично розведених речовин, що входять до складу даного лікарського засобу, не встановлена.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Невідома.

### **Спосіб застосування та дози.**

Разова доза: дорослим – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування). Приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. При кожному загостренні симптомів приймати по 1 таблетці кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин, але не більше 15 таблеток на добу.

Курс лікування – 3-6 тижнів.

При застосуванні препарату понад 4 тижні необхідно контролювати показники функції печінки.

-

**Діти.** Препарат рекомендований для застосування дорослим.

**Передозування.** Не відзначалося.

**Побічні реакції.** У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.