

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ПРИСИПКА ДИТЯЧА

(ASPERSIO PUERILIS)

Склад:

діюча речовина: цинку оксид;

1 г присипки містить цинку оксиду 0,1 г;

допоміжні речовини: тальк, крохмаль картопляний.

Лікарська форма. Порошок.

Основні фізико-хімічні властивості: білого або майже білого кольору, м'який, жирний на дотик порошок.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Препарати цинку.

Код АТХ D02A B.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Адсорбуючий, підсушувальний, антисептичний, протизапальний засіб для зовнішнього застосування. Має високу гігроскопічність, адсорбує виділення потових і сальних залоз, ексудат, зменшує тертя шкірних складок, захищає шкіру від несприятливого зовнішнього впливу.

Цинку оксид спричиняє денатурацію білків і утворення альбумінатів, які пригнічують процес місцевого запалення з ослабленням болючих відчуттів, звужують кровоносні судини, ущільнюють клітинні мембрани. Препарат зменшує вираженість місцевих явищ запалення і подразнення.

Фармакокінетика.

Компоненти препарату не проникають крізь шкіру і не чинять системної дії.

Клінічні характеристики.

Показання.

Попрілості.

Протипоказання.

Гіперчутливість до компонентів препарату, гострі гнійно-запальні захворювання шкіри, мокнучі ділянки шкіри.

Особливі заходи безпеки.

Препарат не застосовувати при інфікованих ушкодженнях і гнійничкових захворюваннях шкіри. Не слід наносити препарат на вологу шкіру.

Поліпшення стану настає після дворазового або триразового застосування препарату. Не слід допускати потрапляння препарату в очі, дихальні шляхи і на відкриту поверхню рани.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами не встановлена.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовувати зовнішньо. Присипку наносити на суху ділянку поприлостей після купання та при замінах пелюшок.

Термін лікування залежить від перебігу захворювання, його визначає лікар індивідуально.

Діти.

Лікарський засіб застосовують в педіатричній практиці.

Передозування.

При місцевому застосуванні передозування малоімовірне. При випадковому прийомі всередину у великих дозах можуть виникати блювання, діарея, стимуляція центральної нервової системи і судоми.

Побічні реакції.

При підвищеній чутливості до препарату можливі алергічні реакції (свербіж, гіперемія, висипання).

У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій необхідно вирішити питання щодо подальшого застосування препарату.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г у контейнері полімерному.

По 50 г у банці, по 1 банці у пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

АТ «ВІТАМІНИ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31.

Заявник.

АТ «ВІТАМІНИ».

Місцезнаходження заявника та/або представника заявника.

Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31.