

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### КАМФОМЕН®

#### **Склад:**

*діючі речовини:* 1 балон містить левоментолу 0,06 г; олії рицинової рафінованої 0,61 г; олії камфорної 10 % для зовнішнього застосування 0,61 г; олії евкаліптової 0,61 г; нітрофуралу 0,002 г (2 мг);

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, ізопропілміристант, хладон 134а.

**Лікарська форма.** Аерозоль.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина зеленувато-жовтого або жовтого кольору зі специфічним запахом.

**Фармакотерапевтична група.**

Препарати, що застосовують при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Має протизапальну, антимікробну дію, які виявляють олія евкаліптова і нітрофурал, а також протинабрякову дію, зумовлену дією олії камфорної та іншими компонентами, що входять до складу препарату. У механізмі дії значну роль відіграють рефлексорні реакції, пов'язані з подразненням чутливих нервових закінчень. Подразнення рецепторів слизових оболонок супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення енкефалінів, ендорфінів, пептидів, які посідають важливе місце у регуляції больових відчуттів, проникності судин порожнини носа, рота, глотки та інших процесів.

*Фармакокінетика.*

Препарат призначати для місцевого застосування, тому його активність не корелює з концентрацією активних речовин у плазмі крові.

## **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

У складі комплексного лікування гострих запальних процесів верхніх дихальних шляхів: фарингітів і фаринголарингітів, ринітів, а також у післяопераційний період після тонзилектомії і видалення поліпів.

### ***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату, похідних нітрофуралу; екзема; коклюш; схильність до бронхоспазму, судом.

Не рекомендується призначати хворим, які працюють в умовах виробництва з великою запыленістю (борошняною, тютюною, азбестовою і цементною).

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не встановлена.

### ***Особливості застосування.***

Не розпилювати поблизу вогню.

Уникати потрапляння препарату в очі. Перед застосуванням препарату особам, схильним до алергії, слід обов'язково порадитися з лікарем.

Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Протипоказань до застосування препарату у період вагітності або годування груддю не виявлено.

### ***Здатність впливати на швидкість реакцій при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не встановлена.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Перед інгаляцією з розпилювача зняти захисний ковпачок, розпилювач ввести у порожнину

носа на глибину 0,5 см або рота і натиснути на його основу. Вміст балона при цьому розпилюється у дрібнодисперсному стані. При 1 натискуванні розпилюється 0,1 г препарату.

Камфомен розпилювати у порожнину носа і рота на фазі вдиху по 2-3 впорскування 3-4 рази на добу після їди. Тривалість застосування становить 5-7 днів.

Як правило, симптоми захворювання минають через 3-5 днів.

### ***Діти.***

Не рекомендується призначати дітям віком до 5 років.

### ***Передозування.***

Можливе посилення проявів побічних реакцій. Терапія симптоматична.

### ***Побічні реакції.***

*З боку імунної системи:* алергічні реакції, включаючи свербіж, висипання, набряк слизової оболонки носа та глотки.

*З боку дихальної системи:* ларингоспазм, осиплість голосу, задишка.

*З боку нервової системи:* головний біль, запаморочення; можливе виникнення судом, спричинених камфорою.

*Місцеві ефекти:* печіння, пов'язане з підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату.

### ***Термін придатності.*** 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

### ***Умови зберігання.***

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.

### ***Упаковка.***

По 30 г у балоні аерозольному алюмінієвому; по 1 балону з розпилювачем в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** АТ «Стома», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 61105, м. Харків, вул. Ньютона, 3.