

# І Н С Т Р У К Ц І Я

для медичного застосування лікарського засобу

ГАЛСТЕНА<sup>0</sup>

(GALSTENA<sup>®</sup>)

## **Склад:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить: Carduus D1 7,4 мг, Taraxacum D6 37,2 мг, Chelidonium D6 37,2 мг, Natrium sulfuricum D12 37,2 мг, Phosphorus D12 37,2 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, крохмаль картопляний, магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі, плоскі таблетки білого кольору з можливими вкрапленнями, з розподільною рискою.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Лікарський засіб Галстена<sup>®</sup> має властивості гепатопротектора, холеретика та холекінетика.

Препарат чинить деяку спазмолітичну та протизапальну дію на гепатобіліарну систему.

**Клінічні характеристики.**

## **Показання.**

Гострі та хронічні захворювання печінки і жовчовивідних шляхів. Хронічний панкреатит – у комплексному лікуванні.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого компонента препарату.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Клінічно значуща взаємодія препарату Галстена® з іншими лікарськими засобами не встановлена. Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

***Особливості застосування.***

1 таблетка містить 226,9 мг лактози моногідрату, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції потрібно проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

На початку лікування препаратом можливе короточасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити.

Оскільки Галстена® містить рослинні природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку та кольору таблетки, що не призводить до зниження якості та ефективності препарату.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* На цей час немає доказів існування особливого ризику застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю. Препарат слід застосовувати з обережністю у період вагітності або годування груддю і тільки у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для плода/дитини. Дані щодо впливу препарату на репродуктивну функцію відсутні.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Препарат не впливає на здатність керувати транспортними та механічними засобами.

***Спосіб застосування та дози.***

*Дорослі та діти віком від 12 років:* по 1 таблетці 2 рази на добу;

*діти віком від 6 до 12 років:* по ½ таблетки 2 рази на добу.

На початку лікування, а також у випадках, коли потрібне швидке усунення симптомів, можливий прийом препарату до 4 разів на добу. Після покращення стану приймати 2 рази на добу.

Для досягнення максимального ефекту препарат Галстена<sup>®</sup>, таблетки, рекомендується приймати в проміжках між прийомами їжі (за 30 хвилин до або через 1 годину після їди). Таблетку рекомендується тримати у роті до повного розчинення.

Якщо симптоми погіршуються або через 7 днів лікування не спостерігається покращення, необхідно припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.

При хронічному перебігу захворювань курс лікування може тривати до 4 тижнів.

*Діти.* Застосовувати лікарський засіб Галстена<sup>®</sup>, таблетки, дітям віком від 6 років.

Дітям віком від 6 до 12 років застосовується за рекомендацією лікаря.

Для лікування дітей віком від 2 до 6 років можна застосовувати препарат Галстена<sup>®</sup> у формі крапель.

**Передозування.** Випадки передозування не виявлені.

**Побічні реакції.** У виняткових випадках в осіб з гіперчутливістю на будь-який з компонентів препарату можливі алергічні реакції. При появі будь-яких побічних ефектів необхідно припинити застосування лікарського засобу та проконсультуватися з лікарем.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 12 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 3, або 4 блістери в картонній упаковці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** Ріхард Біттнер АГ.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Оссіахерштрассе 7, А-9560 Фельдкірхен, Австрія.