

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЕВКАЛІПТА ЛИСТЯ

(EUCALYPTI FOLIUM)

Склад:

діюча речовина: евкаліпта листя (Eucalypti folium);

1 пачка містить евкаліпта листя (Eucalypti folium) – 50 г; 1 фільтр-пакет містить евкаліпта листя (Eucalypti folium) – 1,5 г.

Лікарська форма. Листя.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: шматочки листя різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 5 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий;

порошок крупний: шматочки листя різноманітної форми, подрібнені до розміру часток близько 4 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Евкаліпта листя містить олію ефірну, флавоноїди, речовини дубильні, кислоту елагову, хлорофіл, фенолокислоти. Цей комплекс біологічно активних речовин виявляє антисептичну, протизапальну, болезаспокійливу, в'яжучу, репаративну і відхаркувальну дію. Препарати з листя евкаліпта згубно діють на стрептококи, стафілококи, дизентерійну та кишкові палички, гнійних та анаеробних збудників, сприяють швидкому загоєнню ран.

Клінічні характеристики.

Показання.

Зовнішньо при захворюваннях ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів (стоматити, гінгівіти, ларингіти, фарингіти, трахеїти), свіжих та інфікованих ранах, запальних захворюваннях жіночих статевих органів.

Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі. Бронхіальна астма, бронхоспазм, коклюш, несправжній круп.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

10 г (2 столові ложки) листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолоджувати при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Перед застосуванням настій збовтати.

Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскання 3—4 рази на добу: дорослим та дітям віком від 12 років – 1 столову ложку настою розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 7—12 років – 1 десертну ложку настою розвести у 200 мл кип'яченої води; 3—7 років – 1 чайну ложку настою розвести у 200 мл кип'яченої води.

1—2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскання 3—4 рази на добу: дорослим та дітям віком від 12 років – 2 столові ложки отриманого настою

розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 7—12 років – 1 столову ложку отриманого настою розвести у 200 мл кип'яченої води; 3—7 років – 1 десертну ложку отриманого настою розвести у 200 мл кип'яченої води.

У гінекологічній та хірургічній практиці використовувати у вигляді примочок, промивань і спринцювань.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Приготовлений настій зберігати у прохолодному (8—15 °С) місці не більше 2 діб.

Діти.

Препарат застосовують дітям віком від 3 років.

Передозування.

При тривалому та частому інгаляційному застосуванні можлива сухість слизових оболонок органів дихання.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій припинити прийом препарату.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.