

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ХВОЩА ПОЛЬОВОГО ТРАВА

(EQUISETI ARVENSIS HERBA)

Склад:

діюча речовина: хвоща польового трава (*Equiseti arvensis herba*);

1 пачка містить: хвоща польового трави (*Equiseti arvensis herba*) різано-пресованої 100 г.

Лікарська форма. Трава різано-пресована.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки циліндричної форми, поверхня гладенька, блискуча, зрідка матова, мармурова, на торцях – нерівна. Колір темно-зелений, на торцях – світліший.

Фармакотерапевтична група. Діуретичні препарати. Код АТХ C03B X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять сечогінну, кровоспинну, протизапальну, антимікробну і гіпотензивну дію. Експериментально встановлено, що настої з хвоща польового трави сприяють виведенню свинцю з організму.

Клінічні характеристики.

Показання.

Серцеві та інші захворювання, що супроводжуються набряками; захворювання сечовивідних шляхів (пієліти, цистити, уретрити); легеневі, носові, маткові і гемороїдальні кровотечі; гострі та хронічні отруєння свинцем (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Нефрити, нефрози, нефрозонефрити. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 чайні ложки трави різано-пресованої помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Перед прийомом настій збовтати.

Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу через 1 годину після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки.

Приготовлений відвар зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

Діти. Препарат призначати дітям віком від 12 років.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, свербіж та висипання на шкірі). Може спричинити подразнення тканини нирок, що проявляється болем у попереку та наприкінці сечовипускання. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.