

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**ПСОРИКАП®**

**(PSORICAP)**

### **Склад:**

*діюча речовина:* 1 г крему містить цинку піритіонату 2 мг;

*допоміжні речовини:* метилпарабен (метилпарагідроксибензоат) (Е 218), бутилгідрокситолуол (Е 321), гліцерол моностеарат, полігліцерил-3-метилглюкози дистеарат, сахарози кокоат, метилглюкет-10, спирт стеариловий, октилдодеканола, ізопропілпальмітат, циклометикон, гліцерин, кислоти лимонної моногідрат, вода очищена.

**Лікарська форма.** Крем.

*Основні фізико-хімічні властивості:* крем білого кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Дерматологічні засоби. Код АТХ D11A X12.

### **Фармакологічні властивості.**

#### *Фармакодинаміка.*

Препарат має високу антибактеріальну активність проти ряду патогенних мікроорганізмів, таких як стрептококи, стафілококи, синьогнійна і кишкова палички, протей. Протигрибкова активність препарату особливо виражена відносно *Pityrosporum ovale* та *Pityrosporum orbiculare*, які спричиняють запалення і надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.

Спеціальний склад крему має гідратуючі властивості, збільшує антибактеріальну та протигрибкову дію цинку піритіонату, допомагає усунути печіння та свербіж. Активованій цинку піритіонат, який знаходиться у кремі, пригнічує патологічний ріст клітин поверхневих шарів шкіри, що знаходяться у стані патологічної гіперпроліферації, усуває надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.

#### *Фармакокінетика.*

При зовнішньому застосуванні цинку піритіонат депонується у поверхневих (епідермальних)

шарах шкіри. Системна абсорбція відбувається повільно. Виявляється у крові у слідових кількостях.

### **Клінічні характеристики.**

#### ***Показання.***

Псоріаз, атопічний дерматит, себорейна екзема у дорослих і дітей віком від 1 року, особливо при розповсюджених формах, а також при свербезі, подразненні, запаленні та підвищеній сухості шкіри.

#### ***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до одного з компонентів препарату.

#### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не рекомендується застосовувати одночасно з мазями та кремами, що містять глюкокортикостероїди.

#### ***Особливості застосування.***

Не допускати попадання крему в очі. У випадку попадання крему в очі слід промити їх великою кількістю проточної води та звернутися до лікаря.

У разі збільшення частоти застосування крему можливе виникнення легкого короткотривалого локального печіння шкіри.

Препарат можна застосовувати у період ремісії для підтримуючої терапії і профілактики рецидивів, що дозволяє швидко усунути маніфестну фазу і прискорити клінічне одужання. У період ремісії крем наносять на ділянки шкіри при появі перших ознак загострення захворювання.

Наявність у складі метилпарагідроксибензоату (Е 218) може спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені).

Наявність у складі бутилгідрокситолуолу (Е 321) може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення очей та слизових оболонок.

#### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

У період вагітності або годування груддю препарат застосовувати тільки у випадках, коли користь від застосування перевищує потенційний ризик для плода/дитини. Крем не слід наносити на соски у період годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.*

***Спосіб застосування та дози.***

Змащувати уражену шкіру 2 рази на добу.

При псоріазі курс лікування становить 1-1,5 місяця, при атопічному дерматиті – 3-4 тижні, при інших захворюваннях крем призначають до повного зникнення симптомів. При залишкових явищах (гіперемія, сухість, лущення, пігментація) крем продовжувати застосовувати протягом 1-2 тижнів.

*Діти.* Не застосовувати дітям віком до 1 року.

***Передозування.***

Можливе посилення проявів побічних реакцій.

***Побічні реакції.***

Можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, почервоніння, свербіж, зміни та відчуття печіння у місці нанесення препарату.

***Термін придатності.***

2 роки.

***Умови зберігання.***

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 30 г у тубі, 1 туба в пачці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник/заявник.**

ПАТ «Київмедпрепарат».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника та/або представника заявника.**

01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.