ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ПРИЧЕПИ ТРАВА

(BIDENTIS HERBA)

Склад:

діюча речовина: причепи трава (*Bidentis herba*);

1 пачка містить причепи трави (*Bidentis herba*) 100 г.

Лікарська форма. Трава різано-пресована.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки циліндричної форми довжиною 8–12 мм. Поверхня гладка, блискуча, рідше матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір зелений, темно-зелений, коричнево-зелений, буро-зелений, буро-коричневий зі світлими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні препарати. Код АТХ D11A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини трави чинять сечогінну, потогінну, протизапальну, антиалергічну, жовчогінну і бактерицидну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Внутрішньо у комплексному лікуванні при порушенні обміну речовин, при захворюваннях сечовивідних шляхів, при застудних захворюваннях (ГРЗ, грип); алергії. Зовнішньо – при шкірних захворюваннях алергічного характеру, діатезах, піодермії, псоріазі, екземах, нейродермітах.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1,5–2 чайні ложки трави різано-пресованої помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об’єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу за 15–20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ⅓ склянки; дітям віком 12–14 років – по ¼ склянки.

Зовнішньо настій використовувати для примочок та ванн.

Приготовлений настій зберігати в холодильнику (при температурі від 2 до 8 °С) не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

Діти. Внутрішньо препарат не призначати дітям віком до 12 років.

Передозування. Можливе посилення побічних реакцій.

Побічні реакції.

При гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив’янка).

Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, шосе Київське, будинок 21.