

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**СК-СД, стрептокіназа-стрептодорназа**

**(SK-SD, streptokinase-streptodornase)**

### **Склад:**

*діючі речовини:* стрептокіназа, стрептодорназа;

1 супозиторій містить стрептокінази 15000 МО, стрептодорнази 1250 МО;

*допоміжні речовини:* олія мінеральна, твердий жир.

**Лікарська форма.** Супозиторії ректальні.

*Основні фізико-хімічні властивості:* супозиторії циліндричноконічної форми від білого до бежевого кольору. На зрізі допускається наявність повітряно-пористого стержня та лункоподібної виямки.

**Фармакотерапевтична група.** Гематологічні засоби. Ферменти. Комбінації зі стрептокіназою. Код АТХ В06А А55.

### **Фармакологічні властивості.**

#### *Фармакодинаміка.*

Лікарський засіб «СК-СД, стрептокіназа-стрептодорназа», супозиторії, діє місцево після ректального застосування. Стрептокіназа діє як фібринолітик та розчиняє фібринові та інші згустки. Стрептодорназа розчиняє дезоксирибонуклеопротеїди та дезоксирибонуклеокислоти, у результаті чого знижується в'язкість гнійних ексудатів і розчиняються мертві клітини.

#### *Фармакокінетика.*

Стрептокіназа та стрептодорназа діє місцево на кров'яні згустки, гнійні та некротичні частини клітин та тканин. Лікарський засіб застосовується ректально та не всмоктується в кров'яне русло.

Стрептокіназо-плазміногенний комплекс поступово перетворюється в поліпептиди. Продукти розпаду разом з іншими фрагментами субстратів механічно видаляються. Стрептодорназа після полімеризації ДНК перетворюється на нуклеотидну суміш та механічно видаляється з частинами мертвих клітин.

## **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

- Хронічні запальні процеси маткових придатків;
- післяопераційні інфільтративні ураження органів малого таза;
- ендометрит;
- геморої при гострому та хронічному перебігу;
- параректальні абсцеси і свищі з великим запальним інфільтратом;
- гнійні каудальні кісти.

### ***Протипоказання.***

- Підвищена чутливість до діючих речовин або допоміжних речовин препарату;
- наявність свіжої рани, хірургічного шва або кровотечі до 10 днів (це може спричинити розслаблення швів і, як наслідок, кровотечу з рани);
- одночасне застосування з антикоагулянтами, що може призвести до місцевих кровотеч;
- порушення згортання крові.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Лікарський засіб «СК-СД, стрептокіназа-стрептодорназа» протипоказано застосовувати з антикоагулянтами, оскільки можливі кровотечі.

### ***Особливості застосування.***

Лікарський засіб може викликати місцеві подразнення.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Вплив лікарського засобу «СК-СД, стрептокіназа-стрептодорназа» на фертильність, вагітність і у період годування груддю не вивчався.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає на здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

### ***Спосіб застосування та дози.***

#### Дозування

Курс лікування: 4–18 супозиторіїв. Тривалість курсу: 2–9 діб.

Дозування назначає лікар у відповідності до інтенсивності запального процесу.

*При тяжкому та хронічному перебігу захворювання:*

- по 1 супозиторію 3 рази на добу протягом перших 3 діб;
- по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом наступних 3 діб;
- по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом ще 3 наступних діб.

Курс лікування: 9 днів, 18 супозиторіїв.

*При середньотяжкому перебігу захворювання:*

- по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом перших 3 діб;
- по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом наступних 4 діб,

Курс лікування – 7 днів, 10 супозиторіїв.

*При легкому перебігу захворювання:*

- по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом 2 діб.

Курс лікування: 2 дні, 4 супозиторії.

У разі відсутності результату або у разі настання рецидиву лікар повинен визначити необхідність повторного курсу лікування.

#### Спосіб застосування

Ректально. Супозиторії вводити глибоко у пряму кишку попередньо виийняти супозиторій із блістера. Перед і після застосування препарату слід ретельно вимити руки.

*Діти.*

Лікарський засіб не призначається дітям.

**Передозування.**

Дані щодо передозування стрептокінази і стрептодорнази відсутні.

**Побічні реакції.**

Іноді можуть спостерігатися: місцевий біль, набряк або незначна кровотеча, подразнення, діарея, алергічні реакції, підвищення температури тіла.

**Термін придатності**

2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі 2-8 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 6 супозиторіїв у блістері; по 1, 2 або 3 блістери у картонній упаковці.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.**

Фарміна Лтд.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Вул. Ліпска 44, 30-721, м. Краків, Польща.