# ІНСТРУКЦІЯ

**для медичного застосування лікарського засобу**

**АМІАКУ РОЗЧИН**

***Склад:***

*діюча речовина:* аміак;

100 мл розчину містять 10 г аміаку;

*допоміжна речовина*: вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, дуже лужна рідина з різким запахом. Допускається, при зберіганні, наявність блискіток і/чи легкої каламуті.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що впливають на респіраторну систему. Код АТХ R07A B.

***Фармакологічні властивості.***

*Фармакодинаміка.*

Аміаку розчин належить до лікарських засобів, які подразнюють нервові закінчення.

Механізм дії аміаку при вдиханні полягає у рефлекторному збудженні дихального центру через рецептори верхніх дихальних шляхів – закінчення трійчастого нерва.

При нанесенні на шкіру чинить подразнювальну та антимікробну дію.

*Фармакокінетика.*

Препарат не надходить до кров’яного русла.

**Клінічні характеристики.**

***Показання.*** Непритомний стан, при укусах комах.

***Протипоказання.*** Підвищена чутливість до лікарського засобу.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*** Не встановлена.

***Особливості застосування.***

Місцеве застосування можливе лише на неушкоджену шкіру.

При випадковому ураженні слизової оболонки ока промивати водою декілька разів (протягом 15 хв з перервою 10 хв) або 3 % розчином борної кислоти. Олії і мазі не застосовують. При

ураженні носа і глотки застосовують 0,5 % розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У разі прийому внутрішньо – пити воду, фруктовий сік, молоко, краще – 0,5 % розчин лимонної кислоти або 1 % розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або з іншими механізмами.* Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Для збудження дихального центру як засіб швидкої допомоги: невеликий шматочок марлі або вати, змочений розчином аміаку, обережно підносять до носових отворів на 0,5–1 с. При укусах комах розчин аміаку застосовують зовнішньо у вигляді примочок (тривалість процедури – до 30 секунд).

*Діти.* Препарат не застосовують дітям до 3 років.

***Передозування.***

Посилення проявів побічних реакцій.

Терапія симптоматична.

***Побічні реакції.***

При вдиханні парів розчину аміаку може виникнути рефлекторна зупинка дихання. При місцевому застосуванні можливі подразнення, дерматити, екзема у місці аплікації, алергічні реакції.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

***Термін придатності.*** 2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних, по 200 мл у флаконах скляних з контролем першого відкриття; по 40 мл або по 100 мл, або по 200 мл у флаконах полімерних з контролем першого відкриття.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ПРАТ «ФІТОФАРМ»

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

**Заявник.**

ТОВ «ФК «ВІОЛА»

**Місцезнаходження заявника.**

Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, Об’їзна дорога, будинок 68