

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГЛЮКОВАНС® (GLUCOVANCE®)

Склад:

діючі речовини:

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, по 500 мг/5 мг містить метформіну гідрохлориду - 500 мг і глібенкламіду- 5 мг;

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, повідон, магнію стеарат;

плівкова оболонка: опадрай 31F22700: лактоза, моногідрат; гіпромелоза 15 cP, титану діоксид (Е 171); поліетиленгліколь, заліза оксид жовтий (Е 172), заліза оксид червоний (Е 172), хіноліновий жовтий (Е 104).

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: продовгуватої форми двоопуклі таблетки жовтого кольору, вкриті плівковою оболонкою з гравіюванням «5» з одного боку.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Антидіабетичні препарати. Пероральні гіпоглікемічні засоби, за винятком інсулінів. Комбінація пероральних гіпоглікемічних засобів. Метформін та похідні сульфонілсечовини. Код АТХ A10B D02.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Глюкованс® (Глібенкламід + метформін) є комбінованим препаратом, який діє, сповнюючи функції обох компонентів. Глібенкламід належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.
Метформін належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.
Глюкованс® (Глібенкламід + метформін) є комбінованим препаратом, який діє, сповнюючи функції обох компонентів. Глібенкламід належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.
Метформін належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.

Фармакокінетика.
Абсорбція.
Глюкованс® (Глібенкламід + метформін) є комбінованим препаратом, який діє, сповнюючи функції обох компонентів. Глібенкламід належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.
Метформін належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.

Відносинами.
Глюкованс® (Глібенкламід + метформін) є комбінованим препаратом, який діє, сповнюючи функції обох компонентів. Глібенкламід належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.
Метформін належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.

Відносинами.
Глюкованс® (Глібенкламід + метформін) є комбінованим препаратом, який діє, сповнюючи функції обох компонентів. Глібенкламід належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.

Відносинами.
Глюкованс® (Глібенкламід + метформін) є комбінованим препаратом, який діє, сповнюючи функції обох компонентів. Глібенкламід належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.

Відносинами.
Глюкованс® (Глібенкламід + метформін) є комбінованим препаратом, який діє, сповнюючи функції обох компонентів. Глібенкламід належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.

Відносинами.
Глюкованс® (Глібенкламід + метформін) є комбінованим препаратом, який діє, сповнюючи функції обох компонентів. Глібенкламід належить до пероральних гіпоглікемічних засобів, що діють за механізмом, який відрізняється від інсуліну. Він зменшує секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози, збільшує чутливість до інсуліну в м'язах, що призводить до збільшення поглинання глюкози в тканинах і зменшення рівня глюкози в крові.

