

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

УРОХОЛУМ

(UROCHOLUM)

Склад:

діючі речовини: 1 мл препарату містить водно-спиртовий екстракт (1:1) (екстрагент - етанол 40 %) із суміші: моркви дикої плодів (*Dauci carotae fructus*) 200 мг, ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) 180 мг, споришу трави (*Polygoni avicularis herba*) 150 мг, кукурудзи стовпчиків з приймочками (*Zea mays styli cum stigmatis*) 120 мг, бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) 100 мг, хвоща трави (*Equiseti herba*) 100 мг, хмелю шишок (*Lupuli flos*) 50 мг, берези бруньок (*Betulae gemmae*) 50 мг, звіробою трави (*Hyperici herba*) 40 мг, м'яти листя (*Menthae piperitae folia*) 10 мг;

допоміжні речовини: крім екстрагенту, відсутні.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина темно-коричневого кольору зі специфічним ароматним запахом. При зберіганні допускається утворення осаду.

Фармакотерапевтична група. Засоби, які застосовуються в урології. Код АТХ G04B X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Комбінований препарат рослинного походження. Комплекс біологічно активних речовин Урохолуму, легко всмоктуючись у кров та стимулюючи нирковий та печінковий кровообіг, сприяє збільшенню сечо- та жовчовиділення, нормалізує тонус гладенької мускулатури верхніх сечовивідних шляхів і жовчного міхура, послаблює запальні процеси, чинить бактерицидну, діуретичну, жовчогінну, спазмолітичну дію.

Урохолум чинить антиазотемічний ефект, виводить з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди. Сприяє виведенню піску та каменів з нирок, сечового та жовчного міхурів.

Клінічні характеристики.

Показання.

У складі комплексної терапії гострих та хронічних захворювань (неспецифічної інфекції) сечовивідних шляхів (цистит, уретрит) та нирок (пієлонефрит), хронічних неінфекційних захворювань нирок (нефрит, нефроз); сечокам'яна, нирковокам'яна хвороби та сольовий діатез (профілактика утворення конкрементів, в т.ч. після їх видалення); хронічний холецистит, дискінезія жовчовивідних шляхів.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Зміна реологічних властивостей крові, обтураційна жовтяниця.

Особливі заходи безпеки.

З обережністю застосовувати пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (через можливе виникнення та/або посилення печії).

Не застосовувати препарат, якщо діаметр каменів перевищує 3 мм.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат не застосовують у період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Під час лікування слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати перед вживанням їжі по 10-20 крапель, розводячи невеликою кількістю води, тричі на добу.

Курс лікування визначається лікарем із врахуванням перебігу захворювання, характеру

супутньої терапії та триває від 5 діб до 1 місяця. За призначенням лікаря курс терапії можна повторити.

Перед застосуванням збовтати, оскільки при зберіганні можливе утворення осаду.

Діти.

Препарат не застосовують дітям віком до 12 років.

Передозування.

Посилення побічних реакцій.

Лікування: при передозуванні необхідно призначити велику кількість теплового пиття та провести симптоматичне лікування.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у т.ч. висипання, свербіж, гіперемія, набряк шкіри), запаморочення, диспептичні явища (нудота, блювання).

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл або по 40 мл у флаконі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.