

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ФЛОРИСЕД-ЗДОРОВ'Я

(FLORISED-ZDOROVYE)

Склад:

діючі речовини:

5 мл сиропу містять збору седативного екстракту сухого (екстрагент - вода очищена) [збір седативний містить траву кропиви собачої, шишки хмелю звичайного, листя м'яти перцевої, кореневища з коренями валеріани, корені і кореневища солодки (4:2:1,5:1,5:1)] 311,5 мг;

допоміжні речовини: натрію бензоат (E 211), сорбіт (E 420), аспартам (E 951), пропіленгліколь, гліцерин, поліетиленгліколь, метилпарагідроксибензоат (E 218), пропілпарагідроксибензоат (E 216), ароматизатор «Лимон», що містить мальтодекстрин, гуміарабік, кислоту лимонну; вода очищена.

допоміжні речовини: натрію бензоат (E 211), сорбіт (E 420), аспартам (E 951), пропіленгліколь, гліцерин, поліетиленгліколь, метилпарагідроксибензоат (E 218), пропілпарагідроксибензоат (E 216), ароматизатор «Лимон», вода очищена.|....|

Лікарська форма. Сироп.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина від коричневого до темно-коричневого зі злегка жовтуватим або зеленуватим відтінком кольору, зі специфічним запахом. Допускається опалесценція і випадання невеликого осаду.

Фармакотерапевтична група. Психолептичні засоби. Снодійні і седативні препарати. Код АТХ N05C M.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Комплексний рослинний препарат, дія якого зумовлена властивостями біологічно активних речовин пустирника, хмелю, м'яти, валеріани і солодки (гідроксикоричні кислоти, флавоноїди, терпенові глікозиди тощо). Чинить комплексну седативну дію на центральну нервову систему: має м'який заспокійливий ефект, зменшує психоемоційне напруження, підвищену чутливість до зовнішніх подразників і пов'язані з цим прояви вегетативної дисфункції, усуває порушення сну.

При тривалому застосуванні не викликає медикаментозної залежності.

Клінічні характеристики.

Показання. Легкі форми неврастенії і неврозів, що супроводжуються підвищеною збудливістю, тривогою, відчуттям страху і напруження, дратівливістю, пригніченістю, стомлюваністю, серцево-судинні неврози з кардіалгією і артеріальною гіпертензією, легкі форми порушення сну внаслідок нервової і/або розумової перевтоми, постійна психоемоційна напруга («синдром менеджера»), зниження пам'яті і концентрації уваги, клімактеричний синдром.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, гострі запальні захворювання шлунка і кишечника, синдром подразненого кишечника, виразка шлунка, бронхіальна астма, порушення функції печінки і нирок, гіпокаліємія, тяжкий ступінь ожиріння; депресія та інші захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При застосуванні будь-яких інших лікарських засобів необхідно звернутися до лікаря щодо можливості прийому препарату.

Можливе сумісне застосування з іншими седативними і серцево-судинними лікарськими засобами.

Препарат може потенціювати ефекти алкоголю, серцевих глікозидів, снодійних, психотропних, анальгетичних, спазмолітичних, гіпотензивних препаратів центральної дії; при сумісному застосуванні із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними і петльовими діуретиками, проносними засобами може посилитись гіпокаліємія.

Особливості застосування. Під час лікування слід утримуватися від вживання алкоголю. З обережністю приймати препарат пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією), міокардитом, перикардитом, інфарктом міокарда, брадикардією.

Препарат містить сорбіт, тому, якщо у пацієнта встановлено непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Аспартам, що входить до складу лікарського засобу, є похідним фенілаланіну, що являє небезпеку для хворих на фенілкетонурию.

Наявність у складі метилпарагідроксибензоату (Е 218) та пропілпарагідроксибензоату (Е 216) може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).

Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат протипоказаний у період

вагітності. При необхідності застосування|вживання| препарату годування груддю слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. У період лікування не рекомендується керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Спосіб застосування|вживання| та дози. Приймати внутрішньо дорослим і дітям віком від 12 років по 5–10 мл (1–2 чайні ложки) 1–2 рази на добу (вранці і ввечері) за 15–20 хв до їди. Максимальна добова доза – 20 мл (4 чайні ложки).

При порушеннях сну приймати по 5–10 мл (1–2 чайні ложки) 1 раз ввечері перед сном.

У разі використання сиропу у дозі кратній 10 мл можна використовувати препарат у вигляді саше.

Тривалість курсу лікування залежить від терапевтичного ефекту і становить зазвичай 7 днів. Лікування можна повторити через 1–2 тижні.

Діти. Не застосовувати дітям віком до 12 років (досвід|дослід| застосування|вживання| відсутній).

Передозування. *Симптоми:* загальна слабкість, зниження гостроти слуху і зору, відчуття серцебиття, психічне збудження, виражена втомлюваність, порушення водно-електролітного балансу, посилення проявів побічних реакцій.

Лікування: промивання шлунка, при необхідності – симптоматична терапія; при значній вираженості неврологічних побічних ефектів слід призначити кофеїн.

Побічні реакції.

Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих можуть спостерігатися втомлюваність, сонливість, слабкість, зниження працездатності, головний біль, запаморочення, пригнічення емоційних реакцій, депресія, зниження артеріального тиску, нудота, спастичний біль у животі, гіпокаліємія. В окремих пацієнтів можливі явища диспепсії, реакції гіперчутливості (у т. ч. гіперемія, висип, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка).

Наявність у складі препарату метилпарагідроксибензоату і пропілпарагідроксибензоату може спричинити алергічні реакції (можливо відтерміновані).

У випадку виникнення будь-яких небажаних явищ або незвичних реакцій необхідно звернутися

до лікаря щодо подальшого застосування препарату.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 мл, по 100 мл або по 200 мл у флаконі у коробці; по 10 мл у саше № 20 у коробці.

Категорія відпуску|відпуску|. Без рецепта.

Виробник. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.