Інструкція
для медичного застосування лікарського засобу

ОКСОЛІН

Склад:

діюча речовина: оксолін;

1 г мазі містить оксоліну 2,5 мг;

допоміжні речовини: олія мінеральна; парафін білий м’який.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: густа однорідна маса білого або білого з жовтуватим відтінком кольору. При зберіганні допускається поява рожевого відтінку.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Інші протизастудні лікарські засоби. Код АТХ R05X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Оксолін – противірусний засіб для зовнішнього застосування. Має вірусоцидну активність, блокуючи місця зв’язування вірусу грипу (здебільшого типу А2) з поверхнею клітинної мембрани, захищає клітини від проникнення в них вірусу. До дії оксоліну чутливі також віруси *Herpes simplex*, оперізувального герпесу, аденовіруси, віруси інфекційних бородавок та контагіозного молюска.

Фармакокінетика.

Препарат не токсичний, при місцевому застосуванні системної дії не виявлено, в організмі не накопичується. При нанесенні на слизову оболонку всмоктується 20 % препарату, виводиться здебільшого нирками протягом доби.

Клінічні характеристики.

Показання.

Профілактика грипу, лікування вірусного риніту.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Одночасне інтраназальне застосування з адреноміметичними засобами може призвести до пересушування слизової оболонки носа.

Особливі заходи безпеки.

Мазь не призначена для нанесення на слизову оболонку очей. Препарат не можна наносити на уражену шкіру.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Дані щодо безпеки та ефективності застосування Оксоліну у період вагітності або годування груддю відсутні, тому препарат не бажано застосовувати у ці періоди.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Профілактика грипу: препарат наносити на слизову оболонку носа щоденно 2–3 рази на добу протягом 25 днів або при контакті з хворими.

Лікування вірусного риніту: препарат наносити на слизову оболонку носа щоденно 2–3 рази на добу протягом 3-4 днів.

Діти.

Дані щодо безпеки та ефективності застосування препарату дітям відсутні.

Передозування.

Про випадки передозування дотепер не повідомлялося.

Симптоми: можливі відчуття печіння на слизовій оболонці носа та ринорея.

Лікування: припинити застосування мазі, залишки засобу змити теплою водою.

Побічні реакції.

У місці нанесення мазі може виникати відчуття печіння, яке швидко минає; посилення виділень з носа; забарвлення слизової оболонки у синій колір. Можливий розвиток реакцій гіперчутливості.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до 8 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Не допускається заморожування.

Упаковка.

По 10 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.