

**Інструкція**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**пРОПОЛІСУ Настойка**  
**(PROPOLISI TINCTURA)**

**Склад:**

діюча речовина: прополісу настойка (*propolisi tinctura*);

1 флакон містить прополісу настойки (*propolisi tinctura*) (1:10) (екстрагент — етанол 80 % (об/об)) — 25 мл або 100 мл;

допоміжні речовини: крім екстрагенту, відсутні.

**Лікарська форма.** настойка.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора рідина від жовтувато-коричневого до червонувато-коричневого кольору з характерним запахом прополісу. При зберіганні допускається утворення осаду.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби для лікування ран та виразкових уражень. Препарати, які сприяють загоюванню ран.  
Код ATX D03A X.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Прополіс (бджолиний клей) — продукт життедіяльності бджіл, що містить ряд біогенних речовин: ефірні олії, суміш смол, віск, флавоноїди, флавони, похідні коричної кислоти. Проявляє протимікробну, протизапальну активність, прискорює процеси регенерації (відновлення уражених тканин).

**Фармакокінетика.** Не вивчалася.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Мікротравми і поверхневі ушкодження шкіри, слизових оболонок, отит, фарингіт, тонзиліт, гайморит, пародонтит.

## **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до прополісу або індивідуальна непереносимість, особливо в осіб із захворюваннями печінки або нирок, екзема, алергічні реакції (особливо на продукти бджільництва), кровотечі з уражених ділянок шкіри і слизових оболонок.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не рекомендується одночасно застосовувати з іншими антисептичними засобами або продуктами бджільництва. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

## **Особливості застосування.**

Перед застосуванням лікарського засобу слід проконсультуватися з лікарем.

При застосуванні препарату можливі ускладнення, тому пацієнта необхідно попередити про можливість їх появи. Симптоми непереносимості прополісу можуть виникнути одразу після його застосування або через кілька годин і навіть діб. В окремих пацієнтів вони з'являються лише при проведенні повторного курсу лікування.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності або годування груддю лікарський засіб не рекомендується застосовувати.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

## **Спосіб застосування та дози.**

Настойку прополісу застосовувати місцево дорослим та дітям віком від 3 років у вигляді аплікацій, полоскань, промивань, а також інгаляцій. У випадку мікротравм та гнійних захворювань шкіри настойку прополісу наносити тампоном на уражену ділянку 1-3 рази на добу. Під час лікування зовнішнього гнійного отиту, після туалету слухового проходу, у вухо вводити тампон, змочений настоїкою прополісу (на 1-2 хвилини 2-3 рази на добу), або закапувати по 1-2 краплі настойки прополісу 3-4 рази на добу. У разі хронічного тонзиліту і фарингіту слизову оболонку змащувати 1-2 рази на добу протягом 8-15 днів. Крім того, при тонзиліті настойку прополісу застосовувати для приготування інгаляційного спиртово-водного розчину у співвідношенні 1 : 20.

Проводити 1-2 інгаляції на добу, курс лікування — 7-10 днів. У разі хронічного гаймориту промивати гайморові пазухи розчином, приготовленим із настойки прополісу і 0,9 % розчину

натрію хлориду (у співвідношенні 1 : 10) 2 рази на добу протягом 2 тижнів. У разі пародонтозу настойку прополісу вводити на турундах у пародонтальні кишени на 5 хвилин. У разі поверхневих ерозій і уражень слизової оболонки порожнини рота для полоскання застосовувати розчин, приготовлений з 15 мл настоюки прополісу на 1/2 склянки теплої води, 4-5 разів на добу, протягом 3-4 днів.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

### *Діти.*

Застосовувати дітям віком від 3 років.

### **Передозування.**

*Симптоми:* зникнення апетиту, зниження загального тонусу організму, млявість, поява шкірних висипів.

*Терапія:* лікування антигістамінними препаратами.

### **Побічні реакції.**

Лікарський засіб у звичайних терапевтичних дозах не є токсичним і переноситься добре. Побічні реакції виникають рідко.

Можливі побічні реакції:

- *з боку шкіри та підшкірної клітковини:* крапив'янка, локальний свербіж шкіри, локальний набряк, почервоніння шкіри, пухирі, везикулярні висипи, сухість і тріщини шкіри, особливо на кистях та інших частинах тіла, що контактують з препаратом;
- *з боку центральної нервової системи:* запаморочення;
- *з боку імунної системи:* алергічні реакції, у тому числі алергічний дерматит, гіперемія, свербіж шкіри, висипання, ларингоспазм, задишка, набряк Квінке, підвищення температури тіла;
- *з боку шлунково-кишкового тракту:* нудота;
- *з боку дихальної системи:* задишка.

Можливі місцеві реакції, у тому числі відчуття печіння язика, сухість у роті.

*У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов'язково звернутися до лікаря.*

### **Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

по 25 мл у флаконах скляних.

По 100 мл у флаконах скляних або полімерних.

По 100 мл у фляконі скляному або полімерному; по 1 флякону в пачці з картону.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

АТ «Лубнифарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.