ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ВЕРОНА

(VERONA)

Склад:

діючі речовини: 1 капсула містить: екстракту якірців сланких плодів сухого *(Tribulus terrestris)* (1:5) (екстрагент вода) 300 мг; екстракту вітанії снодійної коріння сухого *(Withania Somnifera)* (1:5) (екстрагент вода) 100 мг; екстракту мукуни пекучої насіння сухого *(Mukuna Pruriens)* (1:5) (екстрагент вода) 25 мг; екстракту аргіреї красивої насіння сухого *(Argyreia speciosa)* (1:5) (екстрагент вода) 60 мг;

допоміжні речовини: тальк, кислотний червоний 14 (Е 122), барвник FD&C жовтий № 6 (Е 110), титану діоксид (Е 171), желатин.

Лікарська форма. Капсули.

Основні фізико-хімічні властивості: капсули червоного кольору розміру № 0 з написом «Верона» на корпусі і ковпачку. Вміст капсул **–** порошок від світло-коричневого до темно-коричневого кольору.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Комплексний лікарський засіб на основі лікарських трав, який має біостимулювальний ефект.

Лікарський засіб відновлює та стимулює клітини Лейдига (які виділяють андрогени) завдяки посиленому виділенню лютеїнізуючого гормону. Сприяє розвитку сім’яних клітин і збільшує кількість клітин Сертолі, які підтримують та зберігають структуру сперматозоїдів, посилює сперматогенні функції. Верона впливає на морфологічні вади сперматозоїдів, посилює їхню рухливість і збільшує кількість сперми, що виділяється, завдяки чому відновлюється фертильна здатність у чоловіків.

Верона також є біостимулятором – діє як геріатричний лікарський засіб, покращує розумову активність завдяки збільшенню кількості ферменту сукцинатдегідрогенази у головному мозку та печінці, що, у свою чергу, збільшує клітинне енергозабезпечення і неспецифічне збільшення опору у стані стресу та напруження. Лікарський засіб діє як імуномодулятор, покращує адаптивну здатність.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

У складі комплексного лікування:

- сексуальної неврастенії, зниження статевого потягу, імпотенції, олігоспермії, астеноспермії, односторонньої або двосторонньої гіпотрофії яєчок, первинного чи вторинного гіпогонадизму у чоловіків;

- втоми та психічного виснаження.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу.

Тяжкі серцево-судинні захворювання, ниркові захворювання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Застосування лікарського засобу з діуретиками може посилити ефекти останніх і потенціювати гіпотензивну дію антигіпертензивних лікарських засобів.

Не рекомендується одночасне застосування лікарського засобу із седативними засобами.

У разі необхідності одночасного прийому будь-яких інших лікарських засобів обов’язково слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Верона не спричиняє звикання.

Важлива інформація про допоміжні речовини.

До складу лікарського засобу входять барвники FD&C жовтий № 6 (Е 110) та кислотний червоний 14 (Е 122), які можуть спричиняти алергічні реакції.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лікарський засіб не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Прийом лікарського засобу впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з точними механізмами (можливе послаблення уваги).

Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням лікарського засобу слід обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Застосовувати всередину дорослим. Капсули приймати вранці (перед сніданком) та ввечері (перед сном), бажано запивати молоком. Доза становить 1–2 капсули 2 рази на добу. Для підтримки загального тонусу рекомендується приймати по 1–2 капсули на добу. Загальна тривалість лікування зазвичай становить від 4 до 8 тижнів. При імпотенції курс лікування становить 10 тижнів, при астеноолігоспермії – не менше 18 тижнів. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Лікарський засіб не слід застосовувати дітям.

Передозування.

Передозування малоймовірне. Повідомлень щодо випадкового передозування не надходило.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції, включаючи кропив’янку, свербіж.

Лікарський засіб може подразнювати слизову оболонку шлунка.

У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій слід припинити прийом лікарського засобу і обов’язково звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 20 або 60 капсул у флаконі № 1, у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед / Herbion Pakistan Private Limited.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Ділянка №30 сектор 28, Промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан /

Plot №30 Sector 28, Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan.