**І Н С Т Р У К Ц І Я**

**для медичного застосування лікарського засобу**

**ЛЬОНУ НАСІННЯ**

**(LINI SEMINA)**

***Склад:***

*діюча речовина:* льону насіння (*Lini semina*);

1 пачка містить: льону насіння (*Lini semina*) 100 г або 200 г;

1 пакет містить: льону насіння (*Lini semina*) 15 г.

**Лікарська форма.** Насіння.

*Основні фізико-хімічні властивості:* насіння сплюснуте, яйцеподібної форми, загострене з одного кінця і округле з іншого, нерівнобоке; поверхня насіння гладенька, блискуча; колір від світло-жовтого до темно-коричневого.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для лікування кислотозалежних захворювань.

Код АТХ А02Х.

***Фармакологічні властивості.***

*Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини препарату чинять обволікаючу, протизапальну і легку проносну дію, вкриваючи тонким шаром слизові оболонки травного тракту та запобігаючи їх подразненню.

**Клінічні характеристики.**

***Показання.***

У складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного тракту (ентерити, коліти, езофагіти, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки), запальних процесів шкіри (фурункульоз, абсцеси).

***Протипоказання.***

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гострий та хронічний холецистит у стадії загострення; непрохідність кишечнику.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*** Невідома.

***Особливості застосування.***

***Застосування у період вагітності або годування груддю.*** За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом іншими механізмами.*** Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

1 чайну ложку насіння залити 100 мл окропу і збовтувати протягом 15 хв, процідити. Внутрішньо застосовувати тільки свіжоприготований препарат у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ¼ склянки, дітям 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Зовнішньо застосовувати сухе нагріте насіння у полотняних мішечках або свіжоперемелене, запарене у невеликій кількості окропу у вигляді припарок при фурункулах та абсцесах для прискорення їх дозрівання.

Тривалість  лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

***Діти.*** Застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

***Передозування.*** При передозуванні можлива діарея.

***Побічні реакції.***

Можливі алергічні реакції, при тривалому застосуванні – діарея та больовий синдром. При виникненні побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

***Термін придатності.*** 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 ºС у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 100 г або по 200 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 15 г у пакетах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнахо-дження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.