

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ПОЛИНУ ГІРКОГО ТРАВА

**(ARTEMISIAE ABSINTHII HERBA)**

### **Склад:**

*діюча речовина:* полину гіркою трава (*Artemisiae absinthii herba*);

1 пачка містить: полину гіркою трави (*Artemisiae absinthii herba*) 50 г, або 75 г;

1 фільтр-пакет містить: полину гіркою трави (*Artemisiae absinthii herba*) 1,5 г.

**Лікарська форма.** Трава.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки листя, стебел, кошиків різної форми сірого, зеленого, жовтого, зеленувато-сірого кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для підвищення апетиту. Код АТХ А15.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини препарату збуджують апетит, стимулюють функцію залоз органів травлення, підвищують секрецію жовчі, панкреатичного і шлункового соків, чинять протизапальну, антисептичну дію.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Для підвищення апетиту і покращення секреторної діяльності органів травлення при гастритах з пониженою секреторною функцією шлунка; у складі комплексної терапії холециститів, дискінезій жовчних шляхів.

#### **Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Виразка шлунка та

дванадцятипалої кишки, жовчокам'яна хвороба; наявність в анамнезі кровотеч із органів малого таза; анемія; епілепсія.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Особливості застосування.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Протипоказано (препарат підвищує тонус матки).

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

2 чайні ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати настій у теплом вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Курс лікування – 2-3 тижні. Між курсами обов'язкові перерви до 2 місяців.

**Діти.** Препарат застосовувати дітям віком від 5 років.

**Передозування.** При тривалому застосуванні можливі атонічні закрепи. Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій та спричинити так звану полинну епілепсію. Лікування симптоматичне.

**Побічні реакції.**

Можливі реакції підвищеної чутливості (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж), нудота, блювання. При появі побічних реакцій препарат відмінити.

**Термін придатності.** 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г, або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.