

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

## КОЛІКІД<sup>0</sup> (COLLICKID<sup>0</sup>)

### **Склад:**

*діюча речовина:* 1 мл суспензії містить симетикон емульсії еквівалентно симетикону 40 мг;

*допоміжні речовини:* полісорбат 80, карбомер, сахарин натрію, гліцерин, натрію бензоат (Е 211), смакова добавка малина, натрію гідроксид, вода очищена.

**Лікарська форма.** Суспензія оральна.

*Основні фізико-хімічні властивості:* суспензія білого кольору з характерним запахом.

## Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах. Силікони.

Код АТХ А03А Х13.

### **Фармакологічні властивості.**

#### *Фармакодинаміка.*

Симетикон, який входить до складу лікарського засобу – це нетоксична інертна поверхнево-активна речовина, виготовлена на основі кремнію, є піногасником. Він змінює поверхневий натяг пухирців газу, що утворюються у кишечнику, і спричиняє їх руйнування. Гази, що вивільняються при цьому, можуть як поглинатися стінками кишечника, так і виводитися з організму завдяки перистальтиці кишечника. Застосування симетикону до початку діагностичних досліджень органів черевної порожнини попереджає виникнення дефектів зображення, що спричиняються пухирцями газу; сприяє ретельному зрошенню слизової оболонки товстої кишки контрастною речовиною, що запобігає розриву контрастної плівки навіть у разі здуття кишечника.

#### *Фармакокінетика.*

Симетикон діє винятково на поверхні пухирців газу і не всмоктується слизовою оболонкою

травного тракту. Симетикон не всмоктується слизовою оболонкою травного тракту і після перорального прийому виводиться у незміненому вигляді. Симетикон не має центральної дії.

### **Клінічні характеристики.**

#### ***Показання.***

- Симптоматичне лікування порушень з боку шлунково-кишкового тракту, пов'язаних з газоутворенням (наприклад, метеоризм, у тому числі у післяопераційний період, коліки у немовлят).
- Як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень органів черевної порожнини (рентгенографія, ультразвукове дослідження) та при підготовці до гастродуоденоскопії.
- Як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або іншими миючими засобами).

#### ***Протипоказання.***

- Підвищена чутливість до лікарського засобу та його компонентів.
- Кишкова непрохідність.
- Обструктивні захворювання травного тракту.

#### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Одночасне застосування симетикону і проносних засобів, що містять мінеральну олію (парафін), не рекомендується, оскільки змішування цих речовин призводить до зменшення ефективності симетикону.

Левотироксин може зв'язуватися з симетиконом. Абсорбція левотироксину у кишечнику може бути порушена при одночасному прийомі з симетиконом.

#### ***Особливості застосування.***

Якщо симптоми з боку шлунково-кишкового тракту (скарги) з'являються повторно або тривають понад 14 днів чи посилюються, слід звернутися за консультацією до лікаря.

Лікарський засіб слід застосовувати з обережністю пацієнтам із обструктивними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Клінічних даних щодо застосування препарату Колікід<sup>а</sup> вагітним немає. Оскільки активний компонент не всмоктується слизовою оболонкою травного тракту, не слід очікувати якоїсь дії лікарського препарату на плід або накопичення препарату у грудному молоці.

Застосування препарату Колікід<sup>®</sup> у період вагітності або годування груддю можливе тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Оскільки симетикон є інертною речовиною, яка не абсорбується, вплив на керування автотранспортом або іншими механізмами практично виключений.

### **Спосіб застосування та дози.**

Для забезпечення точного дозування упаковка містить шприц-дозатор.

*При порушеннях з боку шлунково-кишкового тракту, пов'язаних з газоутворенням*

Вік	Дозування	Частота застосування
Діти віком до 1 року	0,5-1 мл	Колікід <sup>®</sup> додавати у пляшку з дитячим харчуванням при кожному годуванні або за допомогою шприца-дозатора давати до або після годування груддю
Діти віком 1-6 років	1 мл	Препарат застосовувати під час або після вживання їжі кожні 4-6 годин
Діти віком 6-14 років	1-2 мл	
Діти віком від 14 років і дорослі	2 мл	

*Для підготовки до діагностичних досліджень черевної порожнини*

### Рентгенологічні дослідження, ультразвукова діагностика

Вік	Дозування та частота застосування	
	За добу до проведення дослідження	Вранці у день проведення дослідження
Діти	По 1 мл 3 рази на добу	1 мл однократно
Дорослі	По 2 мл 3 рази на добу	2 мл однократно

Для підготовки до гастродуоденоскопії

Вік	Дозування та частота застосування	
	Перед проведенням ендоскопії	Під час проведення ендоскопії
Дорослі	4-8 мл однократно	У разі необхідності ввести кілька мілілітрів суспензії через канал ендоскопа для усунення пухирів газу, що перешкоджають дослідженню

*Як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (залежно від тяжкості отруєння)*

Вік	Дозування
Діти	Від 2,5 до 10 мл
Дорослі	Від 10 до 20 мл

Колікід<sup>а</sup> можна застосовувати також у післяопераційному періоді.

-

#### Метод застосування суспензії оральної

- Добре збовтати вміст флакона перед відкриттям.
- Вставити адаптер (перехідник) для шприца-дозатора у шийку флакона при першому використанні (рис. 1).
- Вставити шприц-дозатор в адаптер (рис. 2), перевернути флакон догори дном (рис. 3) та наповнити шприц-дозатор суспензією, потягнувши поршень до поділки, що відповідає необхідній кількості лікарського засобу у мілілітрах (мл) (рис. 4).
- Перевернути флакон дном донизу та вийняти шприц-дозатор із адаптера (рис. 5).
- Влити вміст шприца-дозатора у ротову порожнину (рис. 6).
- Закрити флакон пластиковим ковпачком, залишивши адаптер на місці.
- Промити шприц-дозатор водою та висушити.

Дітям віком до 1 року суспензію можна додавати у пляшку з дитячим харчуванням.



Лікарський засіб приймати під час або після їди, а у разі необхідності – перед сном.

Тривалість лікування залежить від наявності скарг та визначається лікарем індивідуально.

При необхідності Колікід<sup>а</sup> можна застосовувати протягом тривалого часу.

При повторному виникненні порушень з боку травного тракту та/або у випадку їх тривалого характеру слід провести клінічне обстеження.

*Діти.*

Препарат застосовувати дітям від народження.

### ***Передозування.***

До цього часу випадки передозування невідомі. Оскільки симетикон у хімічному та фізіологічному відношенні є інертним, то інтоксикація практично виключена. У разі застосування більших доз, ніж рекомендовано, слід звернутися до лікаря.

### ***Побічні реакції.***

З боку імунної системи: алергічні реакції, реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, шкірний висип, кропив'янку, набряк обличчя, набряк язика та утруднене дихання.

З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, запор.

### ***Термін придатності.***

3 роки.

### ***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Після першого відкриття флакону препарат зберігати не більше 6 місяців.

### ***Упаковка.***

По 30 мл суспензії у скляному флаконі. Кожен флакон у картонній упаковці разом з шприцом-

дозатором об'ємом 5 мл та адаптером для шприца.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

ТОВ «КУСУМ ФАРМ».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

40020, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Скрябіна, 54.

або

**Виробник.**

ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

40020, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Давидовського Григорія, 54.