**ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

# ПОЛИНУ НАСТОЙКА

***Склад:***

*діюча речовина:* 1 флакон містить настойки трави і листя полину гіркого (1 : 5) (*Absinthii herba et folia*) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл.

**Лікарська форма.** Настойка.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина бурувато-зеленого кольору з характерним запахом. В процесі зберігання можливе випадання осаду.

**Фармакотерапевтична група.** Засіб рослинного походження, що підвищує апетит. Гіркота (amara).

Код АТХ А 15.

***Фармакологічні властивості.***

*Фармакодинаміка.* Подразнює чутливі нервові закінчення смакових рецепторів слизових оболонок порожнини рота, язика, що рефлекторним шляхом викликає підсилення секреції шлункового соку, підвищення апетиту, покращення процесу травлення.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

**Клінічні характеристики.**

***Показання.***

Гіпоацидний і анацидний гастрит, анорексія – у складі комплексної терапії.

***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Підвищена шлункова секреція, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, жовчнокам’яна хвороба, рефлюкс-езофагіт, епілепсія. Вагітність. Дитячий вік до 12 років. Наявність в анамнезі кровотеч із

органів малого таза, анемія.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не виявлена.

***Особливості застосування.***

Лікарський засіб є звичайним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування даного лікарського засобу, чи спостерігаються будь-які побічні реакції.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Не застосовувати жінкам у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Оскільки до складу лікарського засобу входить етанол, він може впливати на здатність керувати автотранспортними засобами або працювати з потенційно небезпечними механізмами, тому на період лікування лікарським засобом слід утриматися від роботи з потенційно небезпечними механізмами.

***Спосіб застосування та дози.***

Приймають внутрішньо по 15–20 крапель 3 рази на добу за 15–30 хв до прийому їжі. Тривалість прийому визначається лікарем індивідуально та залежить від тяжкості захворювання, характеру супутньої терапії, досягнутого ефекту.

*Діти.*

Не слід застосовувати дітям віком до 12 років. Дітям віком від 12 років лікарський засіб застосовують за призначенням лікаря.

***Передозування.***

Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом,

галюцинацій, втрати свідомості.

При тривалому застосуванні можливі атонічні запори.

*Лікування:* симптоматичне.

***Побічні реакції.***

Тривале застосування настойки полину може викликати так звану полинну епілепсію, прийом в підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій та ін.

Нудота, блювання, реакції підвищеної чутливості (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж).

Абсинтин, що міститься у полині, при тривалому вживанні може спричинити атонію кишок. *При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.*

***Термін придатності.*** 5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконах-крапельницях;

по 25 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.**

ТОВ «Тернофарм»

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua