

І Н С Т Р У К Ц І Я

для медичного застосування лікарського засобу

ХЕВЕРТ® СИНУСІТІС

Склад :

діючі речовини: 1 таблетка містить: *Apis mellifica D4* – 10 мг, *Baptisia tinctoria D4* – 5 мг, *Cinnabaris (Hydrargyrum sulfuratum rubrum) D3* – 5 мг, *Echinacea D2* – 30 мг, *Hepar sulfuris D3* – 10 мг, *Kalium bichromicum D8* – 30 мг, *Lachesis mutus D8* – 10 мг, *Luffa operculata D4* – 60 мг, *Mercurius bijodatus D9* – 70 мг, *Silicea D2* – 5 мг, *Euspongia officinalis D6* – 10 мг;

допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; магнію стеарат; крохмаль кукурудзяний.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі двоопуклі таблетки білого кольору, без специфічного запаху, з тисненням «» з обох боків, без видимих дефектів.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.

Клінічні характеристики.

Показання.

У комплексному лікуванні запальних захворювань горла, носа та придаткових пазух носа (синусит).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу та рослин родини складноцвітих. Прогресуючі системні захворювання – туберкульоз, лейкемія, а також лейкемієподібні захворювання, запальні захворювання сполучних тканин (колагенози), аутоімунні захворювання, розсіяний склероз, СНІД, ВІЛ-інфекції або інші хронічні вірусні захворювання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлені.

На ефективність гомеопатичних лікарських засобів можуть негативно впливати прийом алкоголю, стимуляторів, нездоровий спосіб життя. Якщо ви приймаєте будь-який інший лікарський засіб, проконсультуйтеся з лікарем.

Особливості застосування.

При набряках обличчя, пропасниці, сильних головних болях, а також при появі нових симптомів або якщо симптоми захворювання зберігаються при застосуванні лікарського засобу, слід проконсультуватися з лікарем.

Лікарський засіб містить лактозу. Тому, якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб. При захворюваннях щитовидної залози застосовувати тільки після консультації з лікарем. При застосуванні гомеопатичних препаратів симптоми хвороби можуть тимчасово загострюватися; у такому випадку необхідно припинити прийом лікарського засобу і звернутися до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Вплив на здатність керувати машинами і механізмами не виявлений.

Спосіб застосування та дози.

Таблетки слід розсмоктувати або застосовувати сублінгвально.

Дорослим і дітям віком від 3 років при гострих станах призначають по 2 таблетки до 6 разів на добу. При хронічних захворюваннях – по 2 таблетки 4 рази на добу.

У виняткових випадках таблетки можна проковтнути або розчинити у рідині та випити. Дітям віком від 2 до 3 років призначають по 1 таблетці 4 рази на добу. При цьому таблетку можна подрібнити і, розчинивши у воді, дати дитині випити або додати у пюре. Після послаблення симптомів захворювання частоту прийому зменшують. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Досвіду застосування лікарського засобу дітям віком до 2 років немає, тому його не

застосовують пацієнтам цієї вікової категорії.

Передозування.

Про випадки передозування не повідомлялося.

Побічні реакції.

В поодиноких випадках після прийому препарату може спостерігатися посилене слиновиділення, а також шкірні реакції; у такому разі прийом препарату слід припинити. В окремих випадках можуть розвиватися реакції підвищеної чутливості. При застосуванні лікарських засобів, які містять ехінацею, можливі такі побічні реакції, як висипання, свербіж, набряк обличчя, задишка, запаморочення, падіння артеріального тиску. У таких випадках необхідно припинити прийом препарату і звернутися до лікаря.

У разі виникнення побічних реакцій просимо Вас звертатися до контактної особи, відповідальної за фармаконагляд в Україні, компанії ТОВ «Універсальне агентство «ПРО-ФАРМА» за телефоном 044 422 50 72 або на електронну пошту phv@pro-pharma.com.ua.

Термін придатності.

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 таблеток у блістері; 4 блістери в картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Хеверт Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ
(Hevert Arzneimittel GmbH & Co. KG).

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Ін дер Вайхервізе 1, 55569 Нуссбаум, Німеччина

(In der Weiherwiese 1, 55569 Nussbaum, Germany).