

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**Апетистим**

**Склад:**

*діючі речовини:* 100 г сиропу містить складний рідкий екстракт (1:2) з: трави деревію (*Achillea millefolium* L. herba), трави шандри звичайної (*Marrubium vulgare* L. herba), листя меліси (*Melissae officinalis* L. folium), плодів фенхелю (*Foeniculum vulgare* Mill., fructus) (3/2/3/2), екстрагент — вода очищена — 15,0 г;

*допоміжні речовини:* концентрат апельсиновий, натрію бензоат, сахароза, вода очищена.

**Лікарська форма.** Сироп.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина чайного кольору із солодко-гірким смаком і своєрідним запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Засоби, що підвищують апетит. Код АТХ А15.

**Фармакологічні властивості.**

До складу сиропу входить екстракт лікарських трав, що містять гіркоти (трава шандри, листя меліси, трава деревію), і плодів фенхелю, які посилюють секрецію шлункового соку рефлекторним шляхом. Препарат цього типу традиційно застосовують при відсутності апетиту.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Лікарський засіб Апетистим традиційно застосовують при відсутності апетиту.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до активних речовин або до будь-якої допоміжної речовини, або до рослин родини складноцвітих (*Asteraceae*), наприклад до ромашки, календули.

*Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*

Дослідження взаємодії не проводили.

### ***Особливості застосування.***

Пацієнти з рідкісними спадковими розладами, пов'язаними з непереносимістю фруктози, синдромом порушення всмоктування глюкози/галактози або недостатністю сахарози-ізомальтази, не повинні приймати лікарський засіб.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

#### Вагітність та годування груддю

Через відсутність клінічних даних з безпеки не слід застосовувати сироп у період вагітності та годування груддю.

#### Фертильність

Дані відсутні.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Лікарський засіб Апетистим не впливає на здатність керувати автотранспортом і працювати з іншими механізмами.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Сироп приймати перорально, приблизно за пів години до їди.

До упаковки додається мірний стаканчик, який полегшує дозування.

При застосуванні дітям дозу сиропу слід розбавити в невеликій кількості слабкого чаю або води.

#### Дозування

*Діти віком від 3 до 6 років — по 2,5 мл 2 рази на день (мірним стаканчиком).*

*Діти віком від 6 років та підлітки (до 18 років) — по 5 мл 2-3 рази на день (мірним стаканчиком).*

*Дорослі — по 15 мл 3-4 рази на день (мірним стаканчиком).*

### Тривалість застосування

Якщо симптоми посиляться або не припиняться після 10 днів, слід розглянути питання про зміну лікування.

### *Діти.*

Не застосовувати дітям віком до 3 років.

### **Передозування.**

Не описано випадків передозування.

### **Побічні реакції.**

Побічні реакції представлені за системами органів згідно з класифікацією MedDRA і за частотою появи: дуже часто ( $\geq 1/10$ ); часто ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ), рідко ( $\geq 1/10\ 000$  до  $< 1/1000$ ); дуже рідко ( $< 1/10\ 000$ ), частота невідома (неможливо визначити на підставі доступних даних).

При застосуванні Апетистиму можуть спостерігатися:

- розлади шкіри та підшкірної тканини (алергічні шкірні реакції) – частота невідома;
- розлади дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння (алергічні реакції з боку дихальної системи) – частота невідома.

### Повідомлення про підозрювані побічні реакції

Після реєстрації лікарського засобу повідомлення про підозрювані побічні реакції є важливим, оскільки це дає змогу продовжувати контролювати співвідношення користь/ризик застосування лікарського засобу. Медичним працівникам слід повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему фармаконагляду.

**Термін придатності.** 3 роки.

### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25° C, у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка.**

Флакони із кольорового скла, який містить 125 г сиропу, з ковпачком HDPE, з мірним стаканчиком, разом з інструкцією для медичного застосування в коробці з картону.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

Вроцлавське підприємство лікарських трав «Гербаполь» АТ.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

50-951 Вроцлав, вул. Св. Миколая 65/68, Польща.