

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

## ШАВЛІЇ НАСТОЙКА

### (SALVIAE TINCTURA)

#### **Склад:**

*діюча речовина:* настойка шавлії листя;

1 флакон містить настойки шавлії листя (*Salviae folium*) (1:5) (екстрагент — етанол 70,0 % (об/об)) — 25 мл або 40 мл;

*допоміжні речовини:* крім екстрагенту, відсутні.

**Лікарська форма.** Настойка.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина зеленувато-коричневого або коричневого кольору із характерним запахом. При зберіганні допускається утворення осаду.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що сприяють загоюванню (рубцюванню) ран і виразок. Код АТХ D03A X.

#### **Фармакологічні властивості.**

Біологічно активні речовини шавлії листя (ефірна олія, дубильні речовини, сапоніни, фітонциди, смоли) чинять протимікробну, протизапальну, в'яжучу, дезінфекційну дію.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

- Запальні захворювання слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт, пародонтоз), глотки, мигдаликів (фарингіт, тонзиліт), верхніх дихальних шляхів.
- Інфіковані рани, порізи, опіки шкіри.

### ***Протипоказання.***

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

«Шавлії настойка» посилює дію інших протизапальних засобів.

### ***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Перед застосуванням збовтати.

Для полоскання порожнини рота застосовувати у вигляді свіжоприготовленого розчину:

1 чайну ложку «Шавлії настойки» розвести у склянці теплої кип'яченої води.

Для місцевих аплікацій розвести 20–60 крапель настойки в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.

Тривалість курсу лікування залежить від характеру захворювання, досягнутого лікувального ефекту та становить 7–14 днів.

*Діти.*

Клінічний досвід застосування лікарського засобу дітям віком до 12 років відсутній.

### ***Передозування.***

Повідомлення відсутні.

### ***Побічні реакції.***

# **Можливі алергічні реакції (у т. ч. почервоніння та набряк шкіри, висипання, свербіж).**

## *Повідомлення про підозрювані побічні реакції.*

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua/>.

## **Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка.**

По 25 мл або 40 мл у флаконах.

## **Категорія відпуску.**

Без рецепта.

## **Виробник.**

АТ «Лубнифарм».

## **Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.