

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ОСТЕОБІОС

(OSTEOBIOS)

Склад:

діючі речовини: 100 мл крапель містять: Os suis D10 – 5,5 мл; Os suis D30 – 5,5 мл; Os suis D200 – 5,5 мл; Glandula parathyroidea suis D10 – 6 мл; Glandula parathyroidea suis D30 – 6 мл; Glandula parathyroidea suis D200 – 6 мл; Calcium carbonicum D12 – 6 мл; Calcium carbonicum D30 – 6 мл; Calcium carbonicum D200 – 6 мл; Calcium phosphoricum D12 – 6 мл; Calcium phosphoricum D30 – 6 мл; Calcium phosphoricum D200 – 6 мл; Calcium fluoratum D12 – 6 мл; Calcium fluoratum D30 – 6 мл; Calcium fluoratum D200 – 6 мл; Master aminoacid pattern D3 – 5,5 мл; Calcitonin D6 – 6 мл;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 30 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 36 крапель.

Лікарська форма. Краплі для перорального застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин із запахом спирту етилового.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Лікарський засіб нормалізує мінеральний обмін (фосфору, магнію, кальцію) в кістках, збалансовує функціональну активність остеокластів та остеобластів, припиняє виведення кальцію із кісток, поліпшує гістологічну структуру кісткової тканини, стимулює синтез білкових компонентів кісткової тканини.

Фармакокінетика.

Не визначається для гомеопатичного лікарського засобу.

Клінічні характеристики.***Показання.***

При комплексному лікуванні остеопорозу у дорослих і дітей віком від 12 років.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

Особливості застосування.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування, дозу та частоту прийому.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально з урахуванням співвідношення користі/ризиків.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У рекомендованих дозах не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – по 10–20 крапель. Приймати 3 рази на добу, за 30 хвилин до їди або через 1 годину після. Краплі розчинити у 10–15 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

Курс лікування – 1–2 місяці.

Діти.

Не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

Передозування.

У випадку передозування терапія симптоматична.

Побічні реакції.

Небажані впливи невідомі. Можливі реакції гіперчутливості. У випадку появи будь-яких незвичних реакцій хворому слід порадитися з лікарем.

Термін придатності.

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі-крапельниці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 30 мл крапель у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

Гуна С.п.а.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Via Пальманова, 69 - 20132 Мілан, Італія.