

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ПСОРИНОХЕЛЬ Н
(PSORINOHEEL N)

Склад:

діючі речовини:

100 г препарату містить: Bacillinum humanum Nosode D12 – 5 г, Bufo Bufo D10 – 10 г, Cicuta virosa D5 – 5 г, Kaliumtetraiodobismutatum D5 – 5 г, Medorrhinum Nosode D12 – 10 г, Natrium chloratum D12 – 10 г, Nerium oleander D4 – 5 г, Psorinum Nosode D10 – 10 г, Sulfur D6 – 10 г, Thuja occidentalis D6 – 10 г, Vaccinium Nosode D8 – 10 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин із запахом етанолу.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Препарат дезінтоксикаційної, імунокоригуючої, протиексудативної, протизапальної, антидегенеративної та антинеопластичної дії, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.

Клінічні характеристики.

Показання.

У комплексному лікуванні хронічних запальних та дегенеративних захворювань (у т.ч.

нейродерміту, атопічного дерматиту, екземи, псоріазу, цирозу печінки, нефриту, нефрозу), алергічних захворювань.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат сумісний з іншими лікарськими засобами.

Особливості застосування.

При зберіганні симптомів або погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

Препарат доцільно застосовувати для закріплення (поглиблення) результатів комплексної терапії, продовження досягнутої ремісії та попередження подальшого прогресування хронічних захворювань.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Питання про можливість застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар з урахуванням співвідношення ризик/користь.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Випадки впливу невідомі.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дітям віком від 6 до 12 років – 5 крапель, дітям віком від 12 років і дорослим – 8 – 10 крапель 3 рази на добу за 15 – 20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

Ослабленим дітям і дорослим при тривалому та прогресуючому перебігу хронічних захворювань, деяких супутніх захворюваннях прийом препарату необхідно розпочинати з малих доз (1 – 2 краплі), збільшуючи щоденно або через день на 1 – 2 краплі та доводячи до разової вікової дози.

Тривалість лікування та частоту прийому визначає лікар залежно від характеру та перебігу

захворювання.

Зазвичай курс лікування становить 4 – 8 тижнів.

-

Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 6 років.

Досвід застосування препарату дітям віком до 6 років відсутній.

Передозування. Не відзначалося.

Побічні реакції.

Як усі лікарські засоби, цей гомеопатичний препарат може спричинити побічні ефекти, хоча вони виникають не у всіх пацієнтів.

Термін придатності. 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. 30 мл у скляному флаконі-крапельниці у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.