ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

СОСНИ БРУНЬКИ

(GEMMAE PINI)

Склад:

діюча речовина: сосни бруньки (Gemmae Pini);

1 пачка містить сосни бруньки (Gemmae Pini) – 50 г або 100 г.

Лікарська форма. Бруньки.

Основні фізико-хімічні властивості: бруньки (укорочені верхівкові пагони) поодинокі або по кілька штук у мутовках, які оточують більшу велику центральну бруньку, без стебла або з залишками стебла, довжиною не більше 3 мм. Поверхня бруньок вкрита сухими, розташованими по спіралі ланцетовидними, загостреними торочковидними лусками, склеєними між собою смолою, що виступає.

Колір зовні рожевувато-бурий, на зломі зелений або бурий. Довжина бруньок – 1-4 см. Запах приємний, смолистий. Смак гіркуватий.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату стимулюють секреторну активність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, чинять відхаркувальну дію, діють бактерицидно на патогенну мікрофлору носоглотки і ротової порожнини, а також проявляють слабкі сечогінні та потогінні властивості.

Фармакокінетика. Фармакокінетика не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Захворювання дихальних шляхів (хронічні бронхіти, пневмонії); зовнішньо – при ларингітах, трахеїтах, ангіні (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Нефрити, нефрози, пієліти, гломерулонефрити, гепатити, нефропатії вагітних, бронхіальна астма.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказане застосування внутрішньо (може спровокувати ураження нирок).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки бруньок помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані протягом 30 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 10 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об’єм відвару довести кип’яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ⅓ склянки; дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці.

Підігрітий відвар застосовувати місцево для інгаляцій та полоскань.

Перед застосуванням препарат збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям від 3 років.

Передозування.

Передозування та тривале застосування спричиняють запалення слизових оболонок травного тракту, сечовивідних шляхів, головний біль.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри); альбумінурія, гематурія. При інгаляційному застосуванні можливий бронхоспазм.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25° С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69050,Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.