

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
\_\_\_\_\_  
**№**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/7818/01/01**

**ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

## **ОЛІЯ НАСІННЯ ГАРБУЗА**

**Склад:**

*діюча речовина:* 1 флакон містить олії насіння гарбуза (*cucurbitae semina oleum*) 50 мл або 100 мл.

**Лікарська форма.** Олія.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина масляниста зеленувато-бурого кольору, з характерним запахом. Допускається наявність осаду.

**Фармакотерапевтична група.**

Гіполіпідемічні засоби. Код ATX C10A X.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Препарат містить комплекс біологічно активних речовин насіння гарбуза (каротиноїди, токофероли, фосфоліпіди, фосфатиди, флавоноїди, вітаміни В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, С, Р, РР, F, ненасичені, поліненасичені, напівнасичені жирні кислоти: пальмітинову, стеаринову, олеїнову, ліноленову, лінолеву, арахідонову), що зумовлюють антиоксидантну, протисклеротичну, протизапальну, гепатопротекторну, жовчогінну дії. Завдяки фосфатидилхоліну, який активує фермент лецитин-холестеринацетилтрансферазу, препарат переводить вільний холестерин в ефіри холестерину, що не беруть участі у розвитку атеросклерозу. Крім того, фосфатидилхолін включається до складу ліпопротеїнів високої щільності, що сприяє прискоренню транспорту холестерину у мембрани ендотелію та тромбоцитів, попереджає агрегацію останніх. Ненасичені жирні кислоти гальмують абсорбцію холестерину і полегшують екскрецію жирних кислот. Препарат

поліпшує функціональний стан жовчовивідних шляхів, змінює хімічний склад жовчі, чинить незначну жовчогінну дію, зменшує запальні процеси в епітелії жовчовидільної системи. Препарат зменшує набряки, поліпшує мікроциркуляцію і епітелізацію, має протекторний вплив на грануляцію, стимулює трофічні і обмінні процеси у тканинах. Препарат чинить антигіпертензивну дію, пригнічує проліферацію клітин передміхурової залози при її доброкісній гіперплазії, зменшує вираженість запальних процесів, виявляє незначні бактеріостатичні властивості.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Профілактика атеросклерозу судин мозку, серця, гіперліпідемії ІІа та ІІв типу, профілактика та у складі комплексного лікування доброкісної гіперплазії передміхурової залози I та II стадії.

#### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Одночасне застосування з антацидними засобами. Жовчнокам'яна хвороба. Панкреатит.

#### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Антацидні засоби, блокатори Н<sub>2</sub>-гістамінових рецепторів, інгібітори протонної помпи і препарати вісмуту знижують всмоктування олії гарбуза та ефективність препарату.

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

#### **Особливості застосування.**

Препарат не рекомендується приймати хворим із загостренням виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишki, гастритом, езофагітом, дуоденітом, колітом та іншими захворюваннями слизової оболонки травного тракту у стадії загострення.

Препарат слід з обережністю застосовувати хворим, склонним до алергічних реакцій.

Через помірну антитромботичну дію препарата з обережністю слід застосовувати хворим на гемофілію або інші форми геморагічного діатезу, а також пацієнтам, які приймають антикоагулянти. Під час лікування препаратом у таких пацієнтів слід проводити лабораторний контроль показників крові через певні інтервали часу (зазвичай кожні 2-3 місяці).

Рекомендовано припинити застосування препарату щонайменше за 4 дні до операції або

іншого хірургічного втручання.

Якщо препарат застосовується для симптоматичного лікування доброкісної гіпертрофії передміхурової залози, слід регулярно контролювати її стан (кожні 2-3 місяці).

Препарат може послабити симптоми, спричинені збільшенням простати, але на її розміри не впливає.

### *Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Безпека та ефективність застосування препаратору Олія насіння гарбуза у період вагітності або годування груддю невідомі.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Препарат приймають внутрішньо.

Дорослим для профілактики гіперліпідемії слід застосовувати по 1 чайній ложці олії 2 рази на добу, зазвичай протягом 2 місяців. Далі - по  $\frac{1}{2}$  чайної ложки 2 рази на добу. Термін лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання, у середньому - 6 місяців.

При гіперплазії передміхурової залози приймають по 1 чайній ложці 2 рази на добу у середньому протягом 4-5 тижнів, далі - по  $\frac{1}{2}$  чайної ложки 1 раз на добу. Термін лікування визначає лікар, зазвичай - 5 місяців.

### *Діти.*

Безпека та ефективність застосування препаратору дітям невідомі, тому препарат не слід призначати дітям.

### ***Передозування.***

*Симптоми:* пронос, млявість.

*Лікування:* при наявності таких симптомів застосування препаратору слід припинити. Терапія симптоматична.

## **Побічні реакції.**

При тривалому застосуванні можливі рідкі випорожнення, алергічні реакції.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ, необхідно звернутися до лікаря!*

## **Термін придатності.** 2 роки.

## **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка.**

По 50 мл або 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону.

## **Категорія відпуску.**

Без рецепта.

## **Виробник.**

АТ «Лубнифарм».

## **Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.