

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

цмину піщаного квітки

Склад:

діюча речовина:

1 пакет містить цмину піщаного квіток (*Helichrysi arenarii flores*) 50 г.

Лікарська форма. Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: кошики кулеподібні, одинокі або по декілька разом на коротких шерстисто-повстяних квітконосах довжиною до 1 см, діаметром до 7 мм. Кошики складаються із численних квіток, розташованих на голому квітколожі, оточені численними, нещільно притиснутими листочками обгортки. Всі квітки трубчасті, п'ятизубчаті, двостатеві, з чубчиком. Листки обгортки ввігнуті, сухі, плівчасті, блискучі; зовнішні - яйцеподібні, середні - ланцетні, видовжені, внутрішні - вузькі, лінійні. Колір обгортки зеленувато-жовтий, квіток - зеленувато-жовтий або оранжевий. Запах слабкий, приємний.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів.

Код АТХ А05А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарати цмину, які містять флавоноїди, дитерпеновий спирт, стероїдні сполуки, барвники фенольного ряду, жирні кислоти, інозит, ефірну олію, належать до жовчогінних засобів, збільшують жовчовиділення, зменшують концентрацію жовчних кислот і вміст білірубину в жовчі, змінюють співвідношення холестерину/жовчних кислот у бік збільшення холатів, підсилюють тонус жовчного міхура, стимулюють секреторну функцію шлунка та підшлункової залози, підвищують діурез.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Захворювання печінки, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів (холецистити, холецистоангіохоліти, жовчнокам'яна хвороба, гепатити, дискінезії жовчовивідних шляхів).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин лікарського засобу.

Обтураційна жовтяниця, жовчнокам'яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм в діаметрі.

Гострі запальні захворювання печінки, жовчного міхура та підшлункової залози.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

При необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань щодо застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю. Його слід застосовувати у цей період тільки після консультації з лікарем, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

3–4 г (1 столова ложка) квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і тримати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі і процідити. Залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Відвар приймати у теплого вигляді 2–3 рази на добу за 15–20 хв до їди: дорослим по 1/2 склянки; дітям віком 3–7 років – по 1 десертній ложці, 7–12 років – по 1 столовій ложці,

12-14 років - по 2 столові ложки, понад 14 років - по 1/4 склянки.

Перед застосуванням відвар рекомендується збовтувати.

Тривалість лікування визначають індивідуально з урахуванням перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Діти.

Застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Можливе виникнення алергічних реакцій (у т. ч. висипи, кропив'янка, свербіж, гіперемія та набрякання шкіри). При тривалому застосуванні можливі явища холестазу. Підвищення артеріального тиску (при тривалому застосуванні хворими на артеріальну гіпертензію).

При появі будь-яких побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений відвар зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/
місцезнаходження заявника.**

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua