# ІНСТРУКЦІЯ
**для медичного застосування лікарського засобу**

# СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %
**(ETHYL ALCOHOL 70 %)**

***Склад:***
*діюча речовина:* етанол;
не менше 69,3 % об/об і не більше 70,7 % об/об етанолу та вода.

**Лікарська форма.**
Розчин для зовнішнього застосування.
*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

**Фармакотерапевтична група.**
Антисептичні та дезінфекційні засоби.
**Код АТХ** D08A X08.

***Фармакологічні властивості.***
*Фармакодинаміка.*
При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфекційну, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.
*Фармакокінетика.*
При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

**Клінічні характеристики.**
***Показання.***
Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Для хірургічної обробки рук хірургів.

***Протипоказання.***
Підвищена індивідуальна чутливість. Гострі запальні процеси шкіри.

***Особливі заходи безпеки.***
У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою.
Не допускати потрапляння препарату в очі!

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***
При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами не відомі.

***Особливості застосування.***
*Застосування у період вагітності або годування груддю.*
У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*
Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***
Зовнішньо – для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук.
Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1 : 1.

*Діти.*
Застосовують за призначенням лікаря.

***Передозування.***
При зовнішньому застосуванні випадки передозування не відомі.

***Побічні реакції.***
При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

***Термін придатності.***
5 років.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**
По 100 мл у флаконі скляному.
По 100 мл у флаконі полімерному.
По 1 л, 5 л, 10 л у каністрі (для використання у медичних закладах).

**Категорія відпуску.**
**За рецептом.**

**Виробник.**
ТОВ «МЕДЛЕВ».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**
Україна, 49000, місто Дніпро, вулиця Шевченка, буд. 37.