

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

|вживанню|

АЛТЕМІКС

### **Склад:**

*діюча речовина:* 5 мл сиропу містять алтеї кореня екстракту (6,52 : 1) (екстрагент - вода очищена) - 25 мг;

*допоміжні речовини:* амонію гліциризат, натрію бензоат (Е 211), натрію гідрокарбонат, амонію хлорид, олія анісова, сорбіт (Е 420), метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), етанол 96 %, вода очищена.

**Лікарська форма.** Сироп.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина від світло-коричневого|ясно-коричневого| до коричневого кольору зі|із| специфічним запахом анісу. Допускається випадання осаду.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A05.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Комплексний рослинний препарат; відхаркувальний засіб прямої дії, виявляє обволікаючу, пом'якшувальну і протизапальну дію.

Корінь алтеї містить рослинний полісахаридний слиз (до 35 %), а також аспарагін, бетаїн|, пектинові речовини, крохмаль тощо.

Механізм дії зумовлений подразненням рецепторів шлунка і рефлекторною стимуляцією нейронів блювального, дихального і кашльового центрів, що призводить|призводить,наводить| до посилення перистальтики бронхіол і підвищення активності миготливого епітелію бронхів (власне відхаркувальна дія). Крім того, препарат посилює|посилує| функцію бронхіальних залоз, спричиняючи|спричиняючи| розрідження мокротиння, зменшення його в'язкості і збільшення об'єму (резорбтивна секретолітична дія).

Рослинні слизи покривають слизові оболонки тонким шаром, що тривало зберігається на їх поверхні і запобігає|запобігає| подразненню. У результаті зменшується запальний процес і полегшується регенерація тканин. При дії на слизову оболонку шлунка захисна дія плівки з|із| рослинного слизу тим триваліша|, чим вища кислотність шлункового соку (в'язкість

рослинного слизу підвищується при взаємодії з ізо соляною кислотою шлункового соку).

### **Клінічні характеристики.**

**Показання.** Комплексне лікування гострих і хронічних захворювань органів дихання, що супроводжуються кашлем з утрудненим відділенням мокротиння: ларингіт, трахеїт, трахеобронхіт, бронхіт, бронхіальна астма, коклюш|коклюш|.

**Протипоказання.** Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** При сумісному застосуванні з ізо протизапальними засобами препарат пролонгує їх дію, підвищує ефективність і знижує побічну дію. Як відхаркувальний засіб можна поєднувати|сполучати| з натрію бікарбонатом. При сумісному|спільному| застосуванні|вживанні| з протикашльовими препаратами можливе скупчення мокротиння у дихальних шляхах; з антибіотиками – підвищення концентрації антибіотиків у дихальних шляхах|коліях, дорогах|.

**Особливості застосування.** При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендацій лікаря.

Не рекомендується призначення при сухому кашлі, оскільки можливе його посилення.

Утворення плівки з рослинного слизу на поверхні слизової оболонки верхніх дихальних шляхів|колій, доріг| не тільки|не лише| проявляє|робить, виявляє, чинить| виражений|виказаний, висловлений| лікувальний ефект, але і сприяє більш тривалій місцевій дії інших лікарських препаратів.

Перед застосуванням препарат слід збовтувати.

Препарат містить невелику кількість етанолу, менше 100 мг/дозу.

При застосуванні препарату дітям слід враховувати, що одна мірна ложка сиропу (5 мл) містить 0,1 мл етанолу (96 %), тому необхідно чітко дотримуватися вказаних доз для дітей.

Оскільки препарат не містить|утримує| цукру, його можуть приймати хворі на цукровий діабет.

Якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей препарат.

Наявність у складі метилпарабену (Е 218) і пропілпарабену (Е 216) може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Прийом препарату не рекомендується у зв'язку з відсутністю досвіду його застосування у період вагітності або годування груддю. У разі необхідності застосування годування груддю слід припинити.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Застосування препарату не впливає на швидкість реакції, але слід враховувати, що одна мірна ложка сиропу (5 мл) містить 0,1 мл етанолу (96 %).

**Спосіб застосування та дози.** Приймати внутрішньо після|потім| їди. Дорослим і дітям віком від 12 років приймати по 15 мл сиропу (3 мірні ложки). Дітям віком 6-12 років застосовувати по 10 мл сиропу (2 мірні ложки), 2-6 років - по 5 мл сиропу (1 мірна ложка). Кратність прийому для дорослих і дітей віком від 6 років - 4-5 разів на добу, для дітей віком 2-6 років - 3-4 рази на добу.

Дітям віком 2-6 років дозу препарату (5 мл) перед застосуванням розводити в 1 столовій ложці кип'яченої води.

Тривалість курсу терапії визначається лікарем індивідуально залежно від ефективності лікування. Як правило, курс лікування становить 7-14 днів. За показаннями лікар може призначити повторні і більш тривалі курси лікування.

**Діти.** Препарат застосовувати дітям віком від 2 років.

**Передозування.** Симптоми: нудота, блювання.

**Лікування:** відміна препарату, промивання шлунка.

**Побічні реакції.** Можливі алергічні реакції (у т. ч. шкірні висипання, свербіж). У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити прийом препарату і звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після розкриття флакона зберігати у прохолодному місці не більше 10 днів. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** Сироп 25 мг/5 мл по 100 мл у флаконі з мірною ложкою у коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.** Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.