

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

АЛТЕЇ КОРЕНІ

(ALTHAEAE RADICES)

Склад:

діюча речовина: алтеї корені.

Лікарська форма. Корені.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки коренів різної форми. Колір білий, жовтувато-білий, від сірувато-білого до сірувато-коричневого, сіруватий.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини лікарського засобу чинять протизапальну, пом'якшувальну, відхаркувальну, обволікаючу дію, прискорюють регенерацію тканин, зменшують запальний процес.

Клінічні характеристики.

Показання.

Захворювання дихальних шляхів (хронічні бронхіти, трахеїти, ларингіти, пневмонії, бронхіальна астма, коклюш).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Уповільнює всмоктування інших препаратів, що застосовуються одночасно. При сумісному

застосуванні з протизапальними засобами препарат пролонгує їх дію, підвищує ефективність і знижує побічну дію. Як відхаркувальний засіб можна поєднувати з натрію бікарбонатом. При сумісному застосуванні з протикашльовими препаратами можливе скупчення мокротиння у дихальних шляхах, тому не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (наприклад кодеїном); при сумісному застосуванні з антибіотиками підвищує концентрацію антибіотиків у дихальних шляхах.

Особливості застосування.

При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендацій лікаря. Не рекомендується призначення при сухому кашлі, оскільки можливе його посилення. Якщо під час лікування розвивається задишка, підвищення температури або з'являється гнійне мокротиння, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Лікарський засіб є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не вказані в інструкції для медичного застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Прийом препарату не рекомендується у зв'язку з відсутністю досвіду його застосування у період вагітності або годування груддю. При необхідності застосування годування груддю слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку коренів помістити в емальований посуд, залити 100 мл кип'яченої води кімнатної температури і настоювати 1 годину, процідити. Приймати у теплом вигляді: дорослим та дітям віком від 12 років – по 1 столовій ложці 4-6 разів на день, дітям віком

3-7 років – по 1 десертній ложці 4-6 разів на день, 7-12 років – по 1 столовій ложці 4 рази на день. Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування. Нудота, блювання. Лікування: відміна препарату, промивання шлунка.

Побічні реакції. Можливі алергічні реакції (у т. ч. шкірні висипи, свербіж). Посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка.

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їхнім законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

Упаковка. По 40 г або по 60 г, або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/
місцезнаходження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.