

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ГАЙМОРИН

Склад:

діючі речовини: 10 г гранул містять Thuja 6CH 20 мг, Thuja 30CH 20 мг, Silicea 30CH 20 мг, Kalium bichromicum 30CH 20 мг, Seria 30CH 20 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули.

Основні фізико-хімічні властивості: гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Фармакологічні властивості препарату зумовлені поєднанням компонентів, що входять до складу препарату. Проявляє специфічну дію на функції слизової оболонки носа та його пазух, нормалізує процеси обміну та дренажу, полегшує носове дихання.

Клінічні характеристики.

Показання. У складі комплексної терапії: запальні процеси придаткових пазух носа (гострі та хронічні синусити, гострий та хронічний гайморит).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Можливе одночасне застосування з іншими лікарськими засобами. Інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Особливості застосування. Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хв до або через 1 годину після їди. При необхідності гранули можна заздалегідь розчинити у невеликій кількості води.

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини - крупки цукрової - хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату слід проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Жінкам у період вагітності або годування груддю перед застосуванням препарату необхідно проконсультуватися з лікарем, який має оцінити співвідношення користі для матері та потенційного ризику для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Для лікування гострих синуситів, гаймориту чи загострень хронічних процесів придаткових пазух носа застосовувати у комплексній терапії (у поєднанні з будь-якими іншими методами лікування та препаратами) – дорослим по 5 гранул під язик 3-6 разів на добу до поліпшення стану.

При хронічному перебігу хвороби у складі комплексної терапії або як монотерапія – по 5 гранул під язик 1 раз на добу. Курс лікування – 2-3 місяці.

Як користуватися контейнером з дозуванням

1. Візьміть контейнер ковпачком донизу.

3. Зніміть ковпачок з гранулами та використовуйте його, щоб насипати гранули під язик.
2. Повертайте вправо або вліво, доки в ковпачок потрапить потрібна кількість гранул.

Діти.

Ефективність та безпека застосування препарату дітям не вивчені, тому даний лікарський засіб не рекомендується застосовувати цій віковій категорії пацієнтів.

Передозування. У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але в осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 10 г гранул у флаконі з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Тургенєвська, будинок 76-78.